

Підтримувач(і):

Тип розвитку – ярий. Рослина: кущ напівпрямостоячий, середній за висотою. Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві помірний. Початок колосіння: середній. Соломина: слабковиповнена. Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків сильна, довжина відносно колосу - довші. Колос: з відсутнім або дуже слабким восковим нальотом, напівпрямий, має два ряди, циліндричної форми, нещільний, за довжиною середній. Стрижень колосу: довжина першого сегменту коротка та великий вигин. Зернівка: плівка наявна, довгі волоски основної щетинки, відсутня або дуже слабка інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної борізки, охоплююче розташування лодикул, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшкувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка: мають шилоподібну форму верхівки та охоплення соломини перекриваюче. Язичок – довгий.

Різновидність субмедіум . Середньостиглий . Вегетаційний період 89 - 97 днів . Висота рослин 70 - 74 см . Сорт напівінтенсивного типу . За даними заявника рекомендується висівати за 100 - відсоткової господарської придатності 4,5 - 5,0 млн / га насінин . Запізнення із сівбою на 5 - 10 днів призводить до значного недобору врожаю . За роки випробування на державних сортодослідних станціях отримали середній урожай 48,4 - 48,9 ц / га , що на 2,1 - 5,4 відсотки більше стандартів . Потенційна урожайність сорту 95 ц / га . Має хороші круп'яні якості . Сорт стійкий проти полягання , осипання . Посухостійкість середня . Борошнистою россою значно менше уражується ніж стандарти . Агротехніка звичайна для зони вирощування . Протрусення насіння препаратом Вітавакс 200 фф забезпечує повний захист рослин від хвороб і підвищення врожайів .

05012021 Гося

Заявник: Носівська селекційна дослідна станція Чернігівського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку – ярий. Рослина: кущ напівпрямостоячий, середній за висотою. Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві помірний. Початок колосіння: середній. Соломина: слабковиповнена. Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків сильна, за довжиною відносно колосу довші. Колос: з слабкий восковим нальотом, прямий, має два ряди, циліндричної форми, за щільністю середній, за довжиною середній. Стрижень колосу: довжина першого сегменту середня та помірний вигин. Зернівка: плівка наявна, довгі волоски основної щетинки, відсутня або дуже слабка інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної борізки, охоплююче розташування лодикул, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшкувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка: мають загострену форму верхівки та охоплення соломини перекриваюче. Язичок – середній.

Різновидність нутанс . Середньостиглий , вегетаційний період 91 - 97 днів . Солома висотою 83 - 85 см . Сорт інтенсивного типу . Добре реагує на внесення мінеральних добрив . За даними заявника рекомендується висівати за 100 - відсоткової господарської придатності 4 - 4,5 млн / га насінин . За роки випробування в закладах експертизи отримали середній урожай 48,6 - 51,0 ц / га . Відноситься до сортів пивоварного призначення . Білка має 11,8 % , екстрактивних речовин 80 % . Слабко уражується гелмінтоспорізом . Агротехніка звичайна для зони вирощування . Рекомендується протруювання насіння Вітаваксом 200 фф .

05012017 Інклюзив

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку – ярий. Рослина: кущ напівпрямостоячий, низький за висотою. Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві помірний. Початок колосіння: середній. Соломина: слабковиповнена. Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків сильна, за довжиною довші

відносно колосу. Колос: з слабким восковим нальотом, напівпрямий, має два ряди, пірамідальної форми, за щільністю середній, за довжиною середній. Стрижень колосу: довжина першого сегменту коротка та помірний вигин. Зернівка: плівка наявна, довгі волоски основної щетинки, слабка інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної борізки, охоплююче розташування лодикул, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка: мають загострену форму верхівки та охоплення соломини перекиваюче. Язичок – середній.

Різновидність медікум . Середньостиглий , вегетаційний період 90 - 92 дні . Сорт інтенсивного типу , пластичний . Добре реагує на внесення мінеральних добрив . За даними заявника рекомендується висівати за 100 - відсоткової господарської придатності 4,5 -5,0 млн / га насінин . За роки випробування на сортодослідних станціях отримали середній урожай 47,4 - 49,4 ц / га , що на 3,1 відсотка більше стандартів . Потенційна можливість сорту 96 ц / га . Стійкий проти вилягання та осипання . Посухостійкість до виколошування середня , під час наливу зернівок висока . Відноситься до сортів пивоварного призначення . Білка має 11,7 % , крохмалю 57 % , вирівняність зерна 96 % . Стійкий до борошністої роси , гельмінтоспоріозом уражується на рівні стандартів . Агротехніка звичайна для зони вирощування .

05012008 Новосадський 448

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку – ярий. Рослина: кущ розлогий, низький за висотою. Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві слабкий. Початок колосіння: ранній. Соломина: слабковиповнена. Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків помірна, за довжиною відносно колосу довші. Колос: з слабким восковим нальотом, напівпрямий, має два ряди, пірамідальної форми, нещільний, за довжиною середній. Стрижень колосу: довжина першого сегменту середня та слабкий вигин. Зернівка: плівка наявна, довгі волоски основної щетинки, слабка інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, наявне опушення вентральної борізки, форма ромбічна, поверхня грубозморшувата, опушення зовнішньої квіткової луски наявне. Вушка: мають шилоподібну форму верхівки та охоплення соломини перекиваюче. Язичок: середній.

Різновидність медікум . Ранньостиглий , вегетаційний період 88 днів . За даними заявника рекомендується висівати 4,5 - 5,0 млн / га насінин . Сорт добре реагує на внесення мінеральних добрив . За роки випробування в закладах експертизи отримали середній урожай 52,2 ц / га , що на 15,2 відсотка більше стандартів . Стійкий проти вилягання . Посухостійкість до виколошування середня , під час наливу зернівок висока . Особливістю сорту є те , що він відрізняється стійкістю до весняних заморозків . Круп"яні якості добрі . Борошністою росю , гельмінтоспоріозом уражується менше стандартів .

05012003 Новосадський 294

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку – ярий. Рослина: кущ прямостоячий, низький за висотою. Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві помірний. Початок колосіння: дуже ранній. Соломина: слабковиповнена. Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків помірна, за довжиною відносно колосу довші. Колос: з слабким восковим нальотом, горизонтальний, має два ряди, пірамідальної форми, нещільний, за довжиною середній. Стрижень колосу: довжина першого сегменту короткий та помірний вигин. Зернівка: плівка наявна, довгі волоски основної щетинки, слабка інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, наявне опушення вентральної борізки, форма ромбічна, поверхня тонкозморшувата, опушення зовнішньої квіткової луски наявне. Вушка: мають шилоподібну форму верхівки та охоплення соломини неповне. Язичок: довгий.