

відносно колосу. Колос: з слабким восковим нальотом, напівпрямий, має два ряди, піраміdalnoї форми, за щільністю середній, за довжиною середній. Стрижень колосу: довжина першого сегменту коротка та помірний вигин. Зернівка: плівка наявна, довгі волоски основної щетинки, слабка інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опущення центральної борізди, охоплююче розташування лодикул, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкоzemоршкувата, опущення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка: мають загострену форму верхівки та охоплення соломини перекриваюче. Язичок – середній.

Різновидність медікум . Середньостиглий , вегетаційний період 90 - 92 дні . Сорт інтенсивного типу , пластичний . Добре реагує на внесення мінеральних добрив . За даними заявитика рекомендується висівати за 100 - відсоткової господарської придатності 4,5 -5,0 млн / га насіння . За роки випробування на сортодослідних станціях отримали середній урожай 47,4 - 49,4 ц / га , що на 3,1 відсотка більше стандартів . Потенційна можливість сорту 96 ц / га . Стійкий проти вилягання та осипання . Посухостійкість до виколошування середня , під час наливу зернівок висока . Відноситься до сортів пивоварного призначення . Білка має 11,7 % , крохмалю 57 % , вирівняність зерна 96 % . Стійкий до борошнистої роси , гельмінтоспоріозом уражується на рівні стандартів . Агротехніка звичайна для зони вирощування .

05012008 Новосадський 448

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Власник(и):

Підтримувач(и):

Тип розвитку – ярий. Рослина: кущ розлогий, низький за висотою. Пропорцевий листок: восковий наліт на піхві слабкий. Початок колосіння: ранній. Соломина: слабковиповнена. Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків помірне, за довжиною відносно колосу довші. Колос: з слабким восковим нальотом, напівпрямий, має два ряди, піраміdalnoї форми, нещільний, за довжиною середній. Стрижень колосу: довжина першого сегменту середня та слабкий вигин. Зернівка: плівка наявна, довгі волоски основної щетинки, слабка інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, наявне опущення центральної борізди, форма ромбічна, поверхня грубозморшкувата, опущення зовнішньої квіткової луски наявне. Вушка: мають шилоподібну форму верхівки та охоплення соломини перекриваюче. Язичок: середній.

Різновидність медікум . Ранньостиглий , вегетаційний період 88 днів . За даними заявитика рекомендується висівати 4,5 - 5,0 млн / га насіння . Сорт добре реагує на внесення мінеральних добрив . За роки випробування в закладах експертизи отримали середній урожай 52,2 ц / га , що на 15,2 відсотка більше стандартів . Стійкий проти вилягання . Посухостійкість до виколошування середня , під час наливу зернівок висока . Особливістю сорту є те , що він відрізняється стійкістю до весняних заморозків . Круп'яні якості добре . Борошнистою росою , гельмінтоспоріозом уражується менше стандартів .

05012003 Новосадський 294

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Власник(и):

Підтримувач(и):

Тип розвитку – ярий. Рослина: кущ прямостоячий, низький за висотою. Пропорцевий листок: восковий наліт на піхві помірний. Початок колосіння: дуже ранній. Соломина: слабковиповнена. Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків помірне, за довжиною відносно колосу довші. Колос: з слабким восковим нальотом, горизонтальний, має два ряди, піраміdalnoї форми, нещільний, за довжиною середній. Стрижень колосу: довжина першого сегменту короткий та помірний вигин. Зернівка: плівка наявна, довгі волоски основної щетинки, слабка інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, наявне опущення центральної борізди, форма ромбічна, поверхня тонкоzemоршкувата, опущення зовнішньої квіткової луски наявне. Вушка: мають шилоподібну форму верхівки та охоплення соломини неповне. Язичок: довгий.