

відносно колосу. Колос: з слабким восковим нальотом, напівпрямий, має два ряди, пірамідальної форми, за щільністю середній, за довжиною середній. Стрижень колосу: довжина першого сегменту коротка та помірний вигин. Зернівка: плівка наявна, довгі волоски основної щетинки, слабка інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної борізки, охоплююче розташування лодикул, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка: мають загострену форму верхівки та охоплення соломини перекиваюче. Язичок – середній.

Різновидність медікум . Середньостиглий , вегетаційний період 90 - 92 дні . Сорт інтенсивного типу , пластичний . Добре реагує на внесення мінеральних добрив . За даними заявника рекомендується висівати за 100 - відсоткової господарської придатності 4,5 -5,0 млн / га насінин . За роки випробування на сортодослідних станціях отримали середній урожай 47,4 - 49,4 ц / га , що на 3,1 відсотка більше стандартів . Потенційна можливість сорту 96 ц / га . Стійкий проти вилягання та осипання . Посухостійкість до виколошування середня , під час наливу зернівок висока . Відноситься до сортів пивоварного призначення . Білка має 11,7 % , крохмалю 57 % , вирівняність зерна 96 % . Стійкий до борошністої роси , гельмінтоспоріозом уражується на рівні стандартів . Агротехніка звичайна для зони вирощування .

### 05012008 Новосадський 448

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку – ярий. Рослина: кущ розлогий, низький за висотою. Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві слабкий. Початок колосіння: ранній. Соломина: слабковиповнена. Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків помірна, за довжиною відносно колосу довші. Колос: з слабким восковим нальотом, напівпрямий, має два ряди, пірамідальної форми, нещільний, за довжиною середній. Стрижень колосу: довжина першого сегменту середня та слабкий вигин. Зернівка: плівка наявна, довгі волоски основної щетинки, слабка інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, наявне опушення вентральної борізки, форма ромбічна, поверхня грубозморшувата, опушення зовнішньої квіткової луски наявне. Вушка: мають шилоподібну форму верхівки та охоплення соломини перекиваюче. Язичок: середній.

Різновидність медікум . Ранньостиглий , вегетаційний період 88 днів . За даними заявника рекомендується висівати 4,5 - 5,0 млн / га насінин . Сорт добре реагує на внесення мінеральних добрив . За роки випробування в закладах експертизи отримали середній урожай 52,2 ц / га , що на 15,2 відсотка більше стандартів . Стійкий проти вилягання . Посухостійкість до виколошування середня , під час наливу зернівок висока . Особливістю сорту є те , що він відрізняється стійкістю до весняних заморозків . Круп"яні якості добрі . Борошністою росю , гельмінтоспоріозом уражується менше стандартів .

### 05012003 Новосадський 294

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку – ярий. Рослина: кущ прямостоячий, низький за висотою. Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві помірний. Початок колосіння: дуже ранній. Соломина: слабковиповнена. Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків помірна, за довжиною відносно колосу довші. Колос: з слабким восковим нальотом, горизонтальний, має два ряди, пірамідальної форми, нещільний, за довжиною середній. Стрижень колосу: довжина першого сегменту короткий та помірний вигин. Зернівка: плівка наявна, довгі волоски основної щетинки, слабка інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, наявне опушення вентральної борізки, форма ромбічна, поверхня тонкозморшувата, опушення зовнішньої квіткової луски наявне. Вушка: мають шилоподібну форму верхівки та охоплення соломини неповне. Язичок: довгий.

Різновидність медікум . Середньоранній , вегетаційний період 85 - 87 днів . Сорт напівінтенсивного типу . За даними заявника рекомендується висівати за 100 - відсоткової господарської придатності 4 - 4,5 млн / га насінин . Запізнення із сівбою на 5 - 10 днів призводить до значного недобору врожаю / від 3,5 до 7,0 ц / га / . Потенційна можливість сорту 95 ц / га більше стандартів . За роки випробування в закладах експертизи отримали середній урожай 49,8 - 51,5 ц / га , що на 10,1 - 11,1 відсотки більше стандартів . Сорт має хороші круп'яні якості . Стійкий проти полягання , осипання та посухи . Слабко уражується гельмінтоспориозом , більш стійкий проти борошнистої роси . Рекомендується протруювання насіння Вітаваксом 200 фф .

### 05012002 Пек

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Власник(и):

Підтримувач(и):

Тип розвитку – ярий. Рослина: кущ напівпрямостоячий, низький за висотою. Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві помірний. Початок колосіння: дуже ранній. Соломина: слабковиповнена. Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків сильне, за довжиною відносно колосу довші. Колос: з помірним восковим нальотом, прямий, має два ряди, пірамідальної форми, нещільний, за довжиною середній. Стрижень колосу: довжина першого сегменту середня та великий вигин. Зернівка: плівка наявна, довгі волоски основної щетинки, слабка інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, форма еліптична, поверхня тонкозморшувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка: мають тупу форму верхівки та охоплення соломини неповне. Язичок: середній.

Різновидність медікум . Ранньостиглий , вегетаційний період 82 - 87 днів , на 4 - 5 днів раніше дозріває за стандарти . Сорт напівінтенсивного типу . Добре реагує на повне мінеральне живлення . За даними заявника рекомендується висівати за 100 - відсоткової господарської придатності 4 - 4,5 млн / га насінин . Сорт дуже реагує на запізнення із сівбою . За роки випробування в закладах експертизи отримали середній урожай 55,1 - 55,4 ц / га , що на 16,5 - 19,6 відсотків більше стандартів . Потенційна можливість сорту 98 ц / га . Стійкий проти полягання , осипання . Посухостійкість під час кушіння середня , у період наливу зерна висока . Твердою сажкою і карликовою іржею уражується слабо . Агротехніка звичайна для зони вирощування . Потребує обов'язкового протруєння насіння .

### 05012016 Псьол

Заявник: Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(и):

Тип розвитку – ярий. Рослина: кущ напівпрямостоячий, за висотою середній. Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві помірний. Початок колосіння: середній. Соломина: слабко виповнена. Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків помірна, за довжиною довші відносно колосу. Колос: з слабким восковим нальотом, прямий, має два ряди, циліндричної форми, за щільністю середній, за довжиною середній. Стрижень колосу: довжина першого сегменту коротка та помірний вигин. Зернівка: плівка наявна, довгі волоски основної щетинки, відсутня або дуже слабка інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, наявне опушення вентральної боріздки, охоплює розташування лодикул, алейроновий шар слабко забарвлений, форма видовжено-еліптична, поверхня тонко зморшувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка: мають загострену форму верхівки та охоплення соломини перекриваюче. Язичок – середній.

Різновидність нутанс . Середньостиглий , вегетаційний період 90 днів . Солома довжиною 90 см , міцна . За даними заявника рекомендується висівати за 100 - відсоткової господарської придатності 4,5 - 5,0 млн / га насінин . Запізнення із сівбою на 5 - 10 днів призводить до значного недобору врожаю / 3,7 - 4,3 ц / га / . За роки випробування в закладах експертизи отримали середній урожай 50,4 ц / га , що на 8,2 відсотки