

більше стандартів . Потенційна можливість сорту 95 ц / га . Сорт стійкий проти полягання , осипання та посухи . Борошнистою россою , бурою іржею , гельмінтоспоріозом уражується нижче стандартів . Протруєння насіння препаратом Вітавакс 200 фф забезпечує повний захист рослин від хвороб та шкідників підвищення врожаїв .

05012007 Растко

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Власник(и):

Підтримувач(и):

Тип розвитку – ярий. Куц напіврозлогий, рослина середньої висоти. Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві слабкий. Початок колосіння: дуже ранній. Соломина: слабковиповнена. Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків відсутнє або слабке, за довжиною довші відносно колосу. Колос: з слабким восковим нальотом, прямий, має два ряди, пірамідальної форми, дуже нещільний, за довжиною середній. Стрижень колосу: довжина першого сегменту середня та помірний вигин. Зернівка: плівка наявна, довгі волоски основної щетинки, слабка інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, наявне опушення вентральної боріздки, охоплююче розташування лодикул, алеїроновий шар слабко забарвлений, форма ромбічна, поверхня тонко зморшувата, опушення зовнішньої квіткової луски наявне. Вушка: мають загострену форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок – довгий.

Різновидність медікум . Середньостиглий , вегетаційний період 87 - 96 днів .Солома середньої довжини 63- 74 см , міцна .Сорт інтенсивного типу , пластичний . За даними заявника рекомендується висівати за 100 - відсоткової господарської придатності 4 - 4,5 млн / га насінин . Запізнення із сівбою на 5 - 10 днів призводить до значного недобору врожаю . За роки випробування в закладах експертизи отримали середній урожай 49,4 -54,0 ц / га , що на 10,4 - 21,0 відсоток більше стандартів . Потенційна можливість сорту 105 ц / га . Агротехніка звичайна для зони вирощування . Стійкий проти вилягання , осипання та посухи . Відноситься до сортів пивоварного призначення . Білка має 11,3 - 11,8 % , плівчастість 8 -9 % , екстрактивних речовин 80 - 82 % , крохмалю 60 % .Борошнистою россою уражується на рівні стандартів , гельмінтоспоріозом менше стандартів . Протруєння насіння препаратом Вітавакс 200 фф забезпечує повний захист рослин від хвороб .

06012003 Стратус

Заявник: Годовля рослин Стрельце Сполка з о.о.

Власник(и):

Підтримувач(и):

Тип розвитку – ярий. Рослина: куц напівпрямостоячий, низький за висотою. Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві слабкий. Початок колосіння: середнє. Соломина: слабковиповнена. Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків сильна, за довжиною відносно колосу довші. Колос: з слабким восковим нальотом, напівпрямий, має два ряди, пірамідальної форми, нещільний, за довжиною середній. Стрижень колосу: довжина першого сегменту коротка та великий вигин. Зернівка: плівка наявна, довгі волоски основної щетинки, слабка інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, форма еліптична, поверхня тонкозморшувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка: мають загострену форму верхівки та охоплення соломини повне. Язичок: середній.

Різновидність нутанс . Середньостиглий , вегетаційний період 90 днів . Стебло міцне , середньої висоти . Сорт інтенсивного типу . За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4 - 4,5 млн / га насінин . За роки випробування в закладах експертизи отримали середній урожай 55,8 ц / га , що на 17,1 відсотка більше стандартів . Потенційна урожайність сорту 100 ц / га . Стійкий проти вилягання , осипання . Відноситься до сортів пивоварного призначення . Білка має 11,3 % , крохмалю 58 % , плівчастість 7 - 9 % , вирівняність зерна 96 % . Гельмінтоспоріозом уражується на рівні стандартів . Агротехніка звичайна для зони вирощування . Рекомендується протруєння насіння Вітаваксом 200 фф .