

06004120 НК Хеліко

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - дуже сильна. Інтенсивність антоціанового забарвлення повітряних коренів стебла - сильна. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення основи колоскової луски волоті - помірна. Інтенсивність антоціанового забарвлення колоскових лусок за винятком основи - сильна. Волоть середньої щільності. Час появи шовку на качані - пізній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - дуже довга (понад 200 см). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19 - 22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня (від 16 до 18 шт.), колір верхівки та низу зернини - жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня сильна.

Урожайність по зоні Степу - 96,8 ц/га, гарантований приріст складає - 22,6 ц/га. Стійкість до засухи - 8,6 балів, вилягання - 9,0 балів, пухирчастої сажки - 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті - 82,1 %. Вміст крохмалю - 74,5 %, білка - 9,1 %.

05004099 Астері КС

Заявник: Кассад Семанс

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - сильна. Інтенсивність антоціанового забарвлення повітряних коренів стебла - помірна. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення основи колоскової луски волоті - відсутнє або дуже слабе. Інтенсивність антоціанового забарвлення колоскових лусок за винятком основи - слабка. Волоть щільна. Час появи шовку на качані - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15 - 18 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів мала (від 8 до 14 шт.), колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, низу - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - слабка.

Урожайність по зоні Полісся - 85,3 ц/га, гарантована прибавка складає 6,3 ц/га. Стійкість до засухи 8,6 балів, вилягання 8,4 балів, пухирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 82,6 %. Вміст крохмалю 75,8 %, білку 9,0 %.

® 05004039 АДН 343 СВ

Заявник: Науково-виробниче підприємство "Агродніпро-насіння"

Власник(и): Науково-виробниче підприємство "Агродніпро-насіння"

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - сильна. Зигзагоподібність стебла слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення основи колоскової луски волоті - відсутнє або дуже слабе. Антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабе. Волоть щільна. Час появи шовку на качані - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового

забарвлення "шовку" - слабка. Антоціанове забарвлення піхви листка - відсутнє або дуже слабе. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - довгий (від 23 до 26 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня (від 16 до 18 шт.), колір верхівки та низу зернини - жовтий, антоціанове забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Урожайність по зоні лісостепу - 82,7 ц/га, гарантований приріст складає - 4,5 ц/га. Стійкість до засухи - 8,4 балів, вилягання - 9,0 балів, пухирчастої сажки - 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті - 78,5 %. Вміст крохмалю - 75,7 %, білка - 7,4 %.

06004067 Бистриця 400 МВ

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - сильна. Інтенсивність антоціанового забарвлення повітряних коренів стебла - помірна. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - пізній. Інтенсивність антоціанового забарвлення основи колоскової луски волоті - слабка. Інтенсивність антоціанового забарвлення колоскових лусок за винятком основи - слабка. Волоть середньої щільності. Час появи шовку на качані - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - дуже довга (понад 200 см). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19 - 22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала (від 8 до 14 шт.), колір верхівки зернини - жовтий, низу - жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня сильна.

Урожайність по зоні Степу - 89,0 ц/га, гарантований приріст складає - 14,8 ц/га. Стійкість до засухи - 8,6 балів, вилягання - 9,0 балів, пухирчастої сажки - 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті - 80,6 %. Вміст крохмалю - 71,9 %, білка - 9,0 %.

05004069 Гіаліт 391 МВ

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - сильна. Інтенсивність антоціанового забарвлення повітряних коренів стебла - помірна. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення колоскової луски волоті - помірна. Волоть середньої щільності. Час появи шовку на качані - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19 - 22 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня (від 16 до 18 шт.), колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, низу - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 83,8 ц/га, гарантований приріст складає 5,6 ц/га. Стійкість до засухи 8,8 балів, вилягання - 9,0 балів, пухирчастої сажки - 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті - 79,8 %. Вміст крохмалю - 74,9 %, білка - 8,6 %.

05004064 Гардемарин 185 СВ

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):