

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - помірна. Інтенсивність антоціанового забарвлення повітряних коренів стебла - слабка. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення основи колоскової луски волоті - відсутнє або дуже слабке. Інтенсивність антоціанового забарвлення колоскової луски за винятком основи - слабка. Волоть середньої щільності. Час появи шовку на качані - ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - довга (від 181 до 200 см). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - дуже короткий (менший 14 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня (від 16 до 18 шт.), колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, низу - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу зрошення - 82,9 ц/га, гарантований приріст складає - 5,4 ц/га. Стійкість до засухи - 9,0 балів, вилягання - 7,3 балів, пухирчастої сажки - 8,7 балів. Вихід зерна при обмолоті - 80,9 %. Вміст крохмалю - 76,1 %, білка - 8,3 %.

® 05004065 Гіас 182 СВ

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - помірна. Зигзагоподібність стебла відсутня або дуже слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - відсутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті - відсутнє або дуже слабке. Волоть щільна. Час появи шовку на качані - ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Антоціанове забарвлення піхви листка - відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною - коротка (5,1 до 10 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - дуже короткий (менше 14 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня (від 16 до 18 шт.), колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, низу - червоно-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу на зрошенні - 83,2 ц/га, гарантований приріст складає - 5,7 ц/га. Стійкість до засухи - 9,0 балів, вилягання - 8,3 балів, пухирчастої сажки - 8,7 балів. Вихід зерна при обмолоті - 82,2 %. Вміст крохмалю - 73,3 %, білка - 9,0 %.

06004073 Діана 180 СВ

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - помірна. Інтенсивність антоціанового забарвлення повітряних коренів стебла - дуже слабка. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) та час появи шовку - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення основи колоскової луски волоті - помірна. Інтенсивність антоціанового забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабка. Волоть середньої щільності. Антоціанове забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15 - 18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня (від 14 до 18 шт.), колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини червоний, антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє.

Урожайність по зоні Степу - 75,5 ц/га, гарантований приріст складає 12,4 ц/га. Стійкість до засухи 7 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 81%. Вміст крохмалю 70%, білка 10 %.