

06004016 ДК 291

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - сильна. Інтенсивність антоціанового забарвлення повітряних коренів стебла - помірна. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення основи колоскової луски волоті - слабка. Інтенсивність антоціанового забарвлення колоскової луски за винятком основи - сильна. Волоть середньої щільності. Час появи шовку на качані - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - дуже слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - довга (від 181 до 200 см). Ніжка качана за довжиною - довга (20,1 до 40 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15 - 18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала (від 8 до 14 шт.), колір верхівки зернини - жовтий та низу - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 89,2 ц/га, гарантований приріст складає 24,3 ц/га. Стійкість до засухи 9,0 балів, вилягання - 9,0 балів, пухирчастої сажки - 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 82,0 %. Вміст крохмалю 73,4 %, білка 8,6 %.

06004023 ДКС 2949

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Власник(и):

Підтримувач(і):

Антоціанове забарвлення піхви першого листка помірне. Положення листової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок відсутнє або дуже слабке. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення "шовку" відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - довга (20,1 до 40 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів мала (від 8 до 14 шт.), колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня сильна.

Урожайність по зоні Степу - 77,6ц/га, гарантований приріст складає 12,6 ц/га. Стійкість до засухи 9,0 балів, вилягання - 9,0 балів, пухирчастої сажки - 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 81,5 %. Вміст крохмалю 73,1 %, білка 9,3 %.

06004017 ДК 434

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - сильна. Положення листової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення основи колоскової луски волоті - слабка. Інтенсивність антоціанового забарвлення колоскових лусок за винятком основи помірна. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - дуже довга (понад 200 см). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини