

зубовий, кількість зернових рядів середня (від 14 до 18 шт.), колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня помірна.

Урожайність по зоні лісостепу - 90,5 ц/га, гарантований приріст складає -12,2 ц/га. Стійкість до засухи 8,4 балів, вилягання - 9,0 балів, пухирчастої сажки - 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті - 80,1 %. Вміст крохмалю 73,7 %, білка 8,3 %.

06004021 ДКС 3880

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - сильна. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла слабе. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення основи колоскової луски волоті - відсутнє або дуже слабе. Інтенсивність антоціанового забарвлення колоскових лусок за винятком основи сильне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня (від 14 до 18 шт.), колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня сильна.

Урожайність по зоні лісостепу - 89,1 ц/га, гарантований приріст складає - 10,8 ц/га. Стійкість до засухи - 8,4 балів, вилягання - 9,0 балів, пухирчастої сажки - 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті - 80,2 %. Вміст крохмалю - 74,6 %, білка - 8,1 %.

07004027 ЕС Інберроу

Заявник: Євраліс Семанс

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - сильна. Положення листкової пластинки в просторі від похилого до сильно похилого. Інтенсивність антоціанового забарвлення повітряних коренів стебла - дуже сильна. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення основи колоскової луски волоті - помірна. Інтенсивність антоціанового забарвлення колоскових лусок за винятком основи від помірної до сильної. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15 - 18 см). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів середня (від 14 до 18 шт.), колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня помірна.

Урожайність по зоні Степу - 77,1 ц/га, гарантований приріст складає 14,0 ц/га. Стійкість до засухи 8,2 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 81 %. Вміст крохмалю 72 %, білка 10 %.

05004011 ЗУМ 0235

Заявник: Заатен-Уніон ГмБХ

Власник(и):

Підтримувач(і):