

зубовий, кількість зернових рядів середня (від 14 до 18 шт.), колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня помірна.

Урожайність по зоні лісостепу - 90,5 ц/га, гарантований приріст складає -12,2 ц/га. Стійкість до засухи 8,4 балів, вилягання - 9,0 балів, пухирчастої сажки - 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті - 80,1 %. Вміст крохмалю 73,7 %, білка 8,3 %.

### 06004021 ДКС 3880

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - сильна. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла слабе. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення основи колоскової луски волоті - відсутнє або дуже слабе. Інтенсивність антоціанового забарвлення колоскових лусок за винятком основи сильне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня (від 14 до 18 шт.), колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня сильна.

Урожайність по зоні лісостепу - 89,1 ц/га, гарантований приріст складає - 10,8 ц/га. Стійкість до засухи - 8,4 балів, вилягання - 9,0 балів, пухирчастої сажки - 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті - 80,2 %. Вміст крохмалю - 74,6 %, білка - 8,1 %.

### 07004027 ЕС Інберроу

Заявник: Євраліс Семанс

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - сильна. Положення листкової пластинки в просторі від похилого до сильно похилого. Інтенсивність антоціанового забарвлення повітряних коренів стебла - дуже сильна. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення основи колоскової луски волоті - помірна. Інтенсивність антоціанового забарвлення колоскових лусок за винятком основи від помірної до сильної. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15 - 18 см). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів середня (від 14 до 18 шт.), колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня помірна.

Урожайність по зоні Степу - 77,1 ц/га, гарантований приріст складає 14,0 ц/га. Стійкість до засухи 8,2 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 81 %. Вміст крохмалю 72 %, білка 10 %.

### 05004011 ЗУМ 0235

Заявник: Заатен-Уніон ГмБХ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - помірна. Інтенсивність антоціанового забарвлення повітряних коренів стебла - помірна. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті - відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності. Час появи шовку на качані - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть) - довга (від 181 до 200 см). Ніжка качана за довжиною - довга (20,1 до 40 см). Качан за формою циліндричний, за довжиною - середній (від 19 до 22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня (від 16 до 18 шт.), колір верхівки зернини - жовтий, низу - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 95,4 ц/га, гарантований приріст складає 6,0 ц/га. Стійкість до засухи 8,7 балів, вилягання - 9,0 балів, пухирчастої сажки - 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 80,3 %. Вміст крохмалю 74,7 %, білка - 8,6 %.

### **05004073 Кліфтон**

Заявник: КВС ЗААТ АГ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - сильна. Інтенсивність антоціанового забарвлення повітряних коренів стебла - дуже сильна. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення основи колоскової луски волоті - відсутнє або дуже слабке. Інтенсивність антоціанового забарвлення колоскових лусок за винятком основи - слабка. Волоть щільна. Час появи шовку на качані - ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15 - 18 см). Тип зернини кременисто-подібний, кількість зернових рядів мала (від 8 до 14 шт.), колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, низу - оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня - відсутнє або дуже слабке.

Урожайність по зоні Степу - 67,8 ц/га, Полісся - 88,5 ц/га, гарантований приріст відповідно 4,6 і 7,3 ц/га. Стійкість до засухи 8 і 8,6 балів, вилягання - 9 - 8,7 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 81,7-79 %. Вміст крохмалю 73,5-75,2%, білка 8,9 - 10,2 %.

### **06004063 Кіодас**

Заявник: КВС ЗААТ АГ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - сильна. Інтенсивність антоціанового забарвлення повітряних коренів стебла - слабка. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення основи колоскової луски волоті - від помірної до сильної. Інтенсивність антоціанового забарвлення колоскових лусок за винятком основи - слабка. Волоть середньої щільності більш до щільного. Час появи шовку на качані - пізній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть) - дуже довга (понад 200 см). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19 - 22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала (від 8 до 14 шт.), колір верхівки та низу зернини - жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 97,4 ц/га, гарантований приріст складає 19,2 ц/га. Стійкість до засухи -8,5 балів, вилягання - 9,0 балів, пухирчастої сажки - 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті - 80,2 %. Вміст крохмалю - 77,0 %, білка - 8,0 %.