

**06004080 Кіпарус**

Заявник: КВС ЗААТ АГ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - сильна. Інтенсивність антоціанового забарвлення повітряних коренів стебла - помірна. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення основи колоскової луски волоті - відсутнє або дуже слабке. Інтенсивність антоціанового забарвлення колоскових лусок за винятком основи - слабка. Волоть середньої щільності. Час появи шовку на качані - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення "шовку" - відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть) - дуже довга (понад 200 см). Ніжка качана за довжиною - від середньої до довгої. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - від короткого до середнього. Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала (від 8 до 14 шт.), колір верхівки зернини - жовтий, низу - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна. Урожайність по зоні лісостепу - 97,6 ц/га, гарантований приріст складає - 19,3 ц/га. Стійкість до засухи - 8,5 балів, вилягання - 9,0 балів, пухирчастої сажки - 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті - 79,0 %. Вміст крохмалю 77,8 %, білка - 8,1 %.

**06004050 Мотрин 178 СВ**

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Расава"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - сильна. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - відсутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення основи колоскової луски волоті - відсутнє або дуже слабке. Інтенсивність антоціанового забарвлення колоскових лусок за винятком основи - слабка. Волоть середньої щільності. Час появи шовку на качані - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15 - 18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня (від 16 до 18 шт.), колір верхівки зернини - жовтий, низу - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна. Урожайність по зоні Степу - 83,3 ц/га, гарантований приріст складає 20,2 ц/га. Стійкість до засухи 7,8 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 78 %. Вміст крохмалю 73%, білка 9,5 %.

**06004010 Неріса**

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - помірна. Інтенсивність антоціанового забарвлення повітряних коренів стебла - помірна. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті - відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності. Час появи шовку на качані - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть) - довга (від 181 до 200 см). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (від 19 до 22 см). Тип зернини кременисто-подібний, кількість зернових рядів середня (від 16 до 18 шт.), колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, низу - оранжевий, інтенсивність антоціанового

забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу - 70,0 ц/га, Лісостепу - 88,2 ц/га, гарантований приріст відповідно 6,9 і 7,2 ц/га. Стійкість до засухи 8,2 і 8,7 балів, вилягання - 8,8-9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 81,2-79,8 %. Вміст крохмалю 73,7-74,0%, білка 9,4 - 7,7 %.

### **06004003 НК Некта**

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - слабка. Інтенсивність антоціанового забарвлення повітряних коренів стебла - слабка. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті - відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності. Час появи шовку на качані - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15 - 18 см). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів мала (від 8 до 14 шт.), колір верхівки та низу зернини - жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня помірна.

Урожайність по зоні Степу - 72,7 ц/га, Полісся - 90,3 ц/га, гарантований приріст відповідно 7,8 і 4,3 ц/га. Стійкість до засухи 8,0 і 8,5 балів, вилягання - 9,0 - 8,5 балів, пухирчастої сажки - 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 82,3 - 80,3 %. Вміст крохмалю 72,7 - 73,8 %, білка 9,0 - 9,8 %.

### **06004012 НК Пако**

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - сильна. Інтенсивність антоціанового забарвлення повітряних коренів стебла - слабка. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті - відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності. Час появи шовку на качані - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть) - довга (від 181 до 200 см). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (від 19 до 22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня (від 16 до 18 шт.), колір верхівки зернини - жовтий, низу - жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 89,2 ц/га, гарантований приріст складає - 15,0 ц/га. Стійкість до засухи - 7,8 балів, вилягання - 9,0 балів, пухирчастої сажки - 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті - 82,4 %. Вміст крохмалю - 74,9 %, білка - 8,0 %.

### **06004002 НК Тімік**

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - дуже сильна. Інтенсивність антоціанового забарвлення повітряних коренів стебла - сильна. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - пізній. Антоціанове забарвлення основи