

забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу - 70,0 ц/га, Лісостепу - 88,2 ц/га, гарантований приріст відповідно 6,9 і 7,2 ц/га. Стійкість до засухи 8,2 і 8,7 балів, вилягання - 8,8-9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 81,2-79,8 %. Вміст крохмалю 73,7-74,0%, білка 9,4 - 7,7 %.

06004003 НК Некта

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - слабка. Інтенсивність антоціанового забарвлення повітряних коренів стебла - слабка. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті - відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності. Час появи шовку на качані - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15 - 18 см). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів мала (від 8 до 14 шт.), колір верхівки та низу зернини - жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня помірна.

Урожайність по зоні Степу - 72,7 ц/га, Полісся - 90,3 ц/га, гарантований приріст відповідно 7,8 і 4,3 ц/га. Стійкість до засухи 8,0 і 8,5 балів, вилягання - 9,0 - 8,5 балів, пухирчастої сажки - 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 82,3 - 80,3 %. Вміст крохмалю 72,7 - 73,8 %, білка 9,0 - 9,8 %.

06004012 НК Пако

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - сильна. Інтенсивність антоціанового забарвлення повітряних коренів стебла - слабка. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті - відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності. Час появи шовку на качані - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - довга (від 181 до 200 см). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (від 19 до 22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня (від 16 до 18 шт.), колір верхівки зернини - жовтий, низу - жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 89,2 ц/га, гарантований приріст складає - 15,0 ц/га. Стійкість до засухи - 7,8 балів, вилягання - 9,0 балів, пухирчастої сажки - 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті - 82,4 %. Вміст крохмалю - 74,9 %, білка - 8,0 %.

06004002 НК Тімік

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - дуже сильна. Інтенсивність антоціанового забарвлення повітряних коренів стебла - сильна. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - пізній. Антоціанове забарвлення основи