

колоскової луски волоті - відсутнє або дуже слабке. Інтенсивність антоціанового забарвлення колоскової луски за винятком основи - слабка. Волоть середньої щільності. Час появи шовку на качані - від пізнього до дуже пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть) - дуже довга (понад 200 см). Ніжка качана за довжиною - коротка (5,1 до 10 см). Качан за формою циліндричний, за довжиною - середній (19 - 22 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів середня (від 16 до 18 шт.), колір верхівки та низу зернини - жовто - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна. Урожайність по зоні Степу на зрошенні - 117,6 ц/га, гарантований приріст складає - 9,4 ц/га. Стійкість до засухи - 8,8 балів, вилягання - 8,2 балів, пухирчастої сажки - 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті - 82,9 %. Вміст крохмалю - 75,8 %, білка - 7,7 %.

### 06004005 НК Галактік

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Власник(и):

Підтримувач(и):

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - дуже сильна. Інтенсивність антоціанового забарвлення повітряних коренів стебла - дуже сильна. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від пізнього до дуже пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення основи колоскової луски волоті - слабка. Інтенсивність антоціанового забарвлення колоскової луски за винятком забарвлення "шовку" - сильна. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть) - дуже довга (понад 200 см). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19 - 22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня (від 16 до 18 шт.), колір верхівки та низу зернини - жовто - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу на зрошенні - 120,9 ц/га, гарантований приріст складає - 12,7 ц/га. Стійкість до засухи - 9,0 балів, вилягання - 9,0 балів, пухирчастої сажки - 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті - 84,3 %. Вміст крохмалю - 74,1 %, білка - 9,1 %.

### 06004069 Почаївський 190 МВ

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(и):

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - помірна. Інтенсивність антоціанового забарвлення повітряних коренів стебла - слабка. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення основи колоскової луски волоті - відсутнє або дуже слабке. Інтенсивність антоціанового забарвлення колоскових лусок за винятком основи - слабка. Волоть середньої щільності. Час появи шовку на качані - ранній. Антоціанове забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19 - 22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня (від 16 до 18 шт.), колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, низу - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня сильна.

Урожайність по зоні Степу - 76,6 ц/га, гарантований приріст складає 13,5 ц/га. Стійкість до засухи 7,4 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 80,2 %. Вміст крохмалю 71,6%, білка 9,2 %.

### 06004086 ПР39Г93

Заявник: Піонер Семена Холдінг ГезмБХ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - сильна. Інтенсивність антоціанового забарвлення повітряних коренів стебла - дуже сильна. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення основи колоскової луски волоті - дуже сильна. Інтенсивність антоціанового забарвлення колоскових лусок за винятком основи - помірна. Волоть середньої щільності. Час появи шовку на качані - ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19 - 22 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів мала (від 8 до 14 шт.), колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, низу - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня сильна.

Урожайність по зоні Степу - 83,9 ц/га, гарантований приріст складає 20,8 ц/га. Стійкість до засухи 8,2 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 83,2 %. Вміст крохмалю 74,6%, білка 8,4 %.

### **06004088 ПР39Б93**

Заявник:

Піонер Семена Холдінг ГезмбХ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Антоціанове забарвлення піхви першого листка сильне. Положення листової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла слабе. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок слабе. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною ( аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня (від 16 до 18 шт.), колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня сильна.

Урожайність по зоні Степу - 79,3 ц/га, гарантований приріст складає 16,5 ц/га. Стійкість до засухи 8,6 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 81 %. Вміст крохмалю 70 %, білка 9,6 %.

### **® 05004103 ПР39К13**

Заявник:

Піонер Семена Холдінг ГезмбХ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - сильна. Зигзагоподібність стебла відсутня або дуже слабка. Інтенсивність антоціанового забарвлення повітряних коренів стебла - помірна. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення колоскової луски волоті - слабка. Волоть щільна. Час появи шовку на качані - від дуже раннього до раннього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - сильна. Антоціанове забарвлення піхви листка - відсутнє або дуже слабе. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (від 19 до 22 см). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів середня (від 16 до 18 шт.), колір верхівки та низу зернини - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.