

Урожайність по зоні Степу - 71,6 ц/га, гарантований приріст складає 6,7 ц/га. Стійкість до засухи 7,5 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 81,0 %. Вміст крохмалю 75,0%, білка 8,3 %.

### 05004008 ПАН 350

Заявник: Панам Франція САРЛ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - слабка. Інтенсивність антоціанового забарвлення повітряних коренів стебла - помірна. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення колоскової луски волоті - слабка. Волоть середньої щільності. Час появи шовку на качані - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою циліндричний, за довжиною - середній (19 - 22 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня (від 16 до 18 шт.), колір верхівки зернини - жовтий, низу - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Лісостеп - 86,6 ц/га, гарантований приріст складає 8,3 ц/га. Стійкість до засухи 8,8 балів, вилягання - 9,0 балів, пухирчастої сажки - 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 78,2 %. Вміст крохмалю 75,3 %, білка 8,3 %.

### 05004106 ПР37И12

Заявник: Піонер Семена Холдінг ГезмбХ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - сильна. Інтенсивність антоціанового забарвлення повітряних коренів стебла - помірна. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення основи колоскової луски волоті - відсутнє або дуже слабке. Інтенсивність антоціанового забарвлення колоскових лусок за винятком основи - слабка. Волоть середньої щільності. Час появи шовку на качані - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19 - 22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня (від 16 до 18 шт.), колір верхівки зернини - жовтий, низу - жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 94,9 ц/га, гарантований приріст складає - 16,7 ц/га. Стійкість до засухи 8,3 балів, вилягання - 9,0 балів, пухирчастої сажки - 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті - 82,2 %. Вміст крохмалю - 76,4 %, білка - 8,0 %.

### ® 06004030 ПВ 90 - 04

Заявник: Кітчен Сід кампані Інк.

Власник(и): Кітчен Сід кампані Інк.

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - помірна. Зигзагоподібність стебла відсутня або дуже слабка. Інтенсивність антоціанового забарвлення повітряних коренів стебла - помірна. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення основи колоскової луски волоті - відсутнє або дуже слабке. Інтенсивність антоціанового забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабка. Волоть щільна. Час появи шовку на качані - середній. Антоціанове забарвлення

"шовку" - відсутнє або дуже слабе. Антоціанове забарвлення піхви листка - відсутнє або дуже слабе. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (від 19 до 22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня (від 16 до 18 шт.), колір верхівки зернини - жовтий, низу - жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні лісостепу - 85,5 ц/га, гарантований приріст складає - 7,2 ц/га. Стійкість до засухи - 8,6 балів, вилягання - 9,0 балів, пухирчастої сажки - 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті - 78,8 %. Вміст крохмалю - 75,1 %, білка - 8,1 %.

### **06004083 П9571**

Заявник: Піонер Семена Холдінг ГезмбХ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - сильна. Інтенсивність антоціанового забарвлення повітряних коренів стебла - помірна. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення основи колоскової луски волоті - слабка. Інтенсивність антоціанового забарвлення колоскових лусок за винятком основи - сильна. Волоть середньої щільності. Час появи шовку на качані - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть) - дуже довга (понад 200 см). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15 - 18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня (від 16 до 18 шт.), колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, низу - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня сильна.

Урожайність по зоні Степу - 83,8 ц/га, Лісостепу - 96,2 ц/га, гарантований приріст відповідно 16,1 і 17,9 ц/га. Стійкість до засухи - 8,0 і 8,7 балів, вилягання - 9,0 балів, пухирчастої сажки - 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті - 84,5 і 81,1 %. Вміст крохмалю - 72,7 - 74,2 %, білка - 10,3 - 8,1 %.

### **06004089 ПР38М27**

Заявник: Піонер Семена Холдінг ГезмбХ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - сильна. Інтенсивність антоціанового забарвлення повітряних коренів стебла - помірна. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення основи колоскової луски волоті - слабка. Антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи - відсутнє або дуже слабе. Волоть середньої щільності. Час появи шовку на качані - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною - коротка до середньої (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15 - 18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня (від 16 до 18 шт.), колір верхівки зернини - жовтий, низу - жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня сильна.

Урожайність по зоні лісостепу - 96,7 ц/га, гарантований приріст складає - 18,4 ц/га. Стійкість до засухи - 8,4 балів, вилягання - 9,0 балів, пухирчастої сажки - 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті - 82,4 %. Вміст крохмалю - 76,6 %, білка - 8,6 %.

### **® 05004107 ПР37Ф73**

Заявник: Піонер Семена Холдінг ГезмбХ

Власник(и):