

Підтримувач(и):

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - сильна. Зигзагоподібність стебла відсутня або дуже слабка. Інтенсивність антоціанового забарвлення повітряних коренів стебла - помірна. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення колоскової луски волоті - слабка. Волоть щільна. Час появи шовку на качані - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Антоціанове забарвлення піхви листка - відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (від 19 до 22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня (від 16 до 18 шт.), колір верхівки зернини - жовтий, низу - жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні лісостепу - 81,0 ц/га, гарантований приріст складає - 6,8 ц/га. Стійкість до засухи - 8,8 балів, вилягання - 9,0 балів, пухирчастої сажки - 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті - 80,2 %. Вміст крохмалю - 75,0 %, білка - 8,0 %.

® 05004104 ПР39Б76

Заявник: Піонер Семена Холдінг ГезмБХ

Власник(и):

Підтримувач(и):

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - сильна. Зигзагоподібність стебла відсутня або дуже слабка. Інтенсивність антоціанового забарвлення повітряних коренів стебла - помірна. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення колоскової луски волоті - помірна. Волоть щільна. Час появи шовку на качані - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Антоціанове забарвлення піхви листка - відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусний, за довжиною - короткий (від 15 до 18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня (від 16 до 18 шт.), колір верхівки зернини - жовто-білий, низу - жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу на зрошенні - 109,2 ц/га, гарантований приріст складає - 11,9 ц/га. Стійкість до засухи - 9,0 балів, вилягання - 9,0 балів, пухирчастої сажки - 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті - 84,2 %. Вміст крохмалю - 71,5 %, білка - 9,3 %.

06004092 Прікслі

Заявник: Р2н

Власник(и):

Підтримувач(и):

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - сильна. Інтенсивність антоціанового забарвлення повітряних коренів стебла - помірна. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення основи колоскової луски волоті - відсутнє або дуже слабке. Інтенсивність антоціанового забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабка. Волоть середньої щільності. Час появи шовку на качані - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - дуже довга (понад 200 см). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19 - 22 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів мала (від 8 до 14 шт.), колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу на зрошенні - 119,0 ц/га, гарантований приріст складає - 21,7 ц/га. Стійкість до засухи - 9,0 балів, вилягання - 7,0 балів, пухирчастої сажки - 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті - 81,8 %. Вміст крохмалю - 70,0 %, білка - 9,0 %.