

## ® 05004093 Сангрія

Заявник: Маїсадур Семанс

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - сильна. Зигзагоподібність стебла відсутня або дуже слабка. Інтенсивність антоціанового забарвлення повітряних коренів стебла - сильна. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення основи колоскової луски волоті - відсутнє або дуже слабке. Інтенсивність антоціанового забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабка. Волоть щільна. Час появи шовку на качані - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Антоціанове забарвлення піхви листка - відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (від 15 до 18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала (від 8 до 14 шт.), колір верхівки зернини - жовтий, низу - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 91,7 ц/га, гарантований приріст складає - 13,5 ц/га. Стійкість до засухи - 8,6 балів, вилягання - 9,0 балів, пухирчастої сажки - 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті - 80,7 %. Вміст крохмалю - 73,4 %, білка - 8,4 %.

## ® 05004083 Трон МС

Заявник: Науково- виробниче фермерське господарство "Компанія "Маїс"

Власник(и): Науково- виробниче фермерське господарство "Компанія "Маїс"

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - помірна. Зигзагоподібність стебла відсутня або дуже слабка. Інтенсивність антоціанового забарвлення повітряних коренів стебла - помірна. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - пізній. Інтенсивність антоціанового забарвлення основи колоскової луски волоті - помірна. Інтенсивність антоціанового забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабка. Волоть щільна. Час появи шовку на качані - пізній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слабка. Антоціанове забарвлення піхви листка - відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною - коротка (5,1 до 10 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (від 19 до 22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня (від 16 до 18 шт.), колір верхівки зернини - жовтий, низу - жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 83,9 ц/га, гарантований приріст складає - 5,6 ц/га. Стійкість до засухи 8,8 балів, вилягання - 9,0 балів, пухирчастої сажки - 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті - 79,2 %. Вміст крохмалю - 74,2 %, білка - 8,0 %.

## 06004096 Токсол

Заявник: Р2н

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - помірна. Зигзагоподібність стебла слабка. Інтенсивність антоціанового забарвлення повітряних коренів стебла - помірна. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від пізнього до дуже пізнього. Антоціанове забарвлення основи колоскової луски волоті - відсутнє або дуже слабке. Інтенсивність антоціанового забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - помірна. Волоть нещільна. Час появи шовку на качані - дуже пізній. Інтенсивність