

Інтенсивність зеленого забарвлення нестиглого насіння помірна.

Насінина сферичної форми, має просту форму крохмальних зерен, сім'ядолі зеленого кольору із відсутньою зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – середня.

Рослини висотою 52 -72 см . Середньостиглий , вегетаційний період 82 - 90 днів . Маса 1000 насінин 278 - 280 г . Напівінтенсивного типу , придатний до механізованого збирання . За даними заявника рекомендується висівати за 100 - відсоткової господарської придатності 1,2 - 1,4 млн / га насінин . Урожайний . За роки випробування в обласних державних центрах експертизи сортів рослин отримали середній урожай 33,0 - 34,8 ц / га , що на 7,8 - 12,8 відсотків більше стандартів . Стійкий проти вилягання , осипання та посухи . Білка має 23,1 - 24,3 % . Аскохітозом та кореневими гнилями уражується нижче стандартів .

05001008 ЧБЛ-5

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослини сорту середньої висоти, без антоціанового забарвлення і вторинних листочків, з двома-трьома квітками на вузлі, мають середній час і цвітіння, і досягання.

Стебло нефасційоване, середньої довжини та середньою кількістю вузлів з першим фертильним вузлом включно.

Прилисток добре розвинутий з відсутньою формою "кролячих вух", без воскового нальоту, середньої довжини і широкий та малою щільністю плямистості.

Квітка з малою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистка та загострену форму верхівки верхнього чашолистка на другому квітучому вузлі.

Колір паруса білий з середньою максимальною його шириною, піднесеною формою основи та слабкою інтенсивністю хвилястості.

Біб має середню кількість насінних зачатків, середньої довжини та широкий, жовтого кольору з наявною пергаментністю, випуклим типом вигину та середнім ступенем його прояву.

Насінина сферичної форми, має просту форму крохмальних зерен, сім'ядолі зеленого кольору із відсутньою зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – середня.

Рослини висотою 54 -67 см . Середньостиглий , вегетаційний період 84 - 92 днів . Маса 1000 насінин 269 - 288 г . Напівінтенсивного типу , придатний до механізованого збирання . За даними заявника рекомендується висівати за 100 -відсоткової господарської придатності 1,2 - 1,4 млн / га насінин . Урожайний . За роки випробування в обласних державних центрах експертизи сортів рослин отримали середній урожай 31,3 - 35,4 ц / га , що на 8,0 - 10,8 відсотки більше стандартів . Стійкий проти вилягання та осипання . Білка має 23,9 - 21,1 % . Аскохітозом та антракнозом уражується нижче стандартів .

Квасоля звичайна

07087002 Двадесятица

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослини сорту пізнього часу цвітіння, мають сланкий кущовий тип росту з низькою висотою кущів та антоціановим забарвленням.

Листки дуже світло-зеленого кольору зі слабкою зморшкуватістю. Середній листок середній за розміром, трикутної форми з гострою формою верхівки.

Суцвіття за повного цвітіння знаходиться в листках.

Квітка має білий колір і крилець, і білий паруса та середній розмір приквітка.

Біб (включно з гачком) короткий, середньої ширини посередині та з серцевидною формою поперечного перетину (через насінину) з маленьким відношенням ширини впоперек до відстані між швами, зморшкуватою текстурою його поверхні та різко вираженим звуженням у сухому стані.

Біб – помірно-зеленого кольору без наявних плям вторинного кольору та волокнистості, з увігнутою формою вигину, відсутнім або дуже слабким ступенем його вигину та тупою формою верхівки (за виключенням гачка).

Гачок – короткий з відсутнім або дуже слабким його вигином.

Колір нестиглого насіння на початку потовщення бобів- світло-зелений.

Стигле насіння має еліптичну форму поздовжнього перетину, малу ширину поперечного перетину з еліптичною формою його перетину.

Стигле насіння - однокольорове, біле зі слабким жилкуванням. Колір кільця навкруг рубчика – однаковий з фоном насінини. Маса 1000 насінин – середня (близько 400 г).

Вегетаційний період – 65-70 діб. Висота рослини 45-50 см. Висота прикріплення першого бобу – 20 см. Товарний урожай рослин сорту становить 16-17 т/га. Сорт стійкий до обсипання та вилягання.

07087001 Златко

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Власник(и):

Підтримувач(и):

Рослини сорту середнього часу цвітіння, мають сланкий кущовий тип росту з низькою висотою кущів та антоціановим забарвленням.

Листки світло-зеленого кольору з сильною зморшкуватістю. Середній листок великий, округлої форми з коротко загостреною формою верхівки.

Суцвіття за повного цвітіння знаходиться частково в листках.

Квітка має рожевий колір і крилець, і білий паруса та середній розмір приквітка.

Біб (включно з гачком) має середні величини довжини і ширини посередині та вісімковидну форму поперечного перетину (через насінину) з середнім відношенням ширини впоперек до відстані між швами, зморшкуватою текстурою його поверхні та різко вираженим звуженням у сухому стані.

Біб – світло-зеленого кольору з наявним плямами вторинного кольору фіолетового тону помірної щільності, відсутньою волокнистістю, має сильний ступінь вигину S- подібної форми та тупу форму верхівки (за виключенням гачка).

Гачок – короткий з відсутнім або дуже слабким його вигином.

Стигле насіння має еліптичну форму поздовжнього перетину, середню ширину поперечного перетину та вузько-еліптичну форму поперечного перетину.

Стигле насіння - однокольорове, коричневе зі слабким жилкуванням. Колір кільця навкруг рубчика – відрізняється від фону насінини. Маса 1000 насінин – велика (450 г).

Вегетаційний період – 85-90 діб. Висота рослини 35-40 см. Висота прикріплення першого бобу – 15 см. Товарний урожай рослин сорту становить 18-19 т/га. Сорт стійкий до обсипання та вилягання.

05087003 Яринка

Заявник: Національний аграрний університет