

На час досягання рослини також високі та характеризуються сильною здатністю до кущистості та слабкою здатністю до гілкування, мають середньої товщини головне стебло та середню його залистяність.

Листок на час викидання волоті темно-зелений. На час дозрівання листок – довгий та широкий.

На час викидання волоті має помірне знебарвлення середньої жилки. Інтенсивність зеленого забарвлення прапорцевого листок середньої жилки порівняно з пластинкою листка світліша, а жовте її забарвлення відсутнє або дуже слабке.

Колоскова луска і під час цвітіння, і при дозрівання – світло-зеленого кольору та має середню довжину.

Квітка за довжиною – коротка. Приймочка дуже коротка з відсутнім або дуже слабким жовтим забарвленням. На нижній квітковій лусці остюк відсутній або дуже слабо розвинений. Сухі тичинки мають світло-жовте забарвлення.

Волоть і на кінець цвітіння, і на час досягання помірно щільна, пірамідальна, за довжиною без шийки коротка та має середньої довжини гілочки першого порядку в середній третині волоті. Шийка волоті над пазухою – середня.

Зернівка після досягання білого кольору, має округу форму зі спинки і еліптичну в профіль, середній розмір зародку, наполовину відкриту поверхню від насінної шкірки.

Структура ендосперму зерна в поздовжньому розрізі на ? склоподібна з помірною екструзивною здатністю та високою твердістю, білого кольору.

Маса 1000 зерен – мала.

Середня урожайність сорту за термін випробування в зоні Степу - 49,3 ц/га., Сорт відноситься до середньостиглої групи. Маса 1000 зерен - 28,6 г. Висота рослин - 164 см. Стійкий до вилягання 9 балів, осипання 9 балів, засухи 8,9 балів. Стійкий проти сажки, гельмінтоспоріозу та іржі. Вміст білку -12,5 %, крохмалю - 75,6 %, та жиру - 4,1%

## Рис

### 07009001 Віконт

Заявник: Інститут рису Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослини сорту з безбарвним колеоптиле, відсутньою чоловічою стерильністю, мають пряме положення стебел з середнім часом як викидання волоті, так і її досягання.

Стебло не здатне утворювати коліно, середніх довжини та товщини з антоціановим забарвленням міжвузлів та зі слабким антоціановим забарвленням вузлів.

Листки мають середні показники і довжини, і ширини з помірною інтенсивністю зеленого забарвлення, без антоціанового забарвлення листової пластинки і піхви, відсутньою або дуже слабкою опушеністю поверхні пластинки та середнім старінням (пожовтінням): на час збирання врожаю один листок зберігає свій колір.

Шийка та вушка - без антоціанового забарвлення. Язичок гострий і безбарвний.

Прапорцевий листок як за раннього обстеження має напівпряме положення пластинки, так за пізнього.

Рослини сорту мають середню кількість волотей без остюків з середньою довжиною головної осі та прямим її вигином, без вторинного гілкування. Положення гілок волоті - пряме.

Колосок з білим забарвленням приймочки, має середньої довжини нижню стерильну колоскову луску солом'яного кольору.

Нижня квіткова луска зі слабким антоціановим забарвленням як кіля та зони під верхівкою, так і самої верхівки, зі відсутнім або слабким її опушенням та чорим кольором її верхівки.

Зернівка має середні довжину та ширину з наявною реакцією нижньої квіткової луски на фенол. Забарвлення зернівки у фенолі світле.

Обрушена зернівка білого кольору, без аромату, має напівкруглу форму збоку, середні довжину та ширину.

Ендосперм – неглютинозний, має 16-20 % амілази та слабо дигестує (розщеплюється).  
Маса 1000 розвинених зерен – середня (30 г).

Урожайність сорту в період випробування в зоні Степу - 113,4 ц/га. Відноситься до середньостиглої групи. Має подовжену форму зерна.  
Висота рослин - 92 см. Сорт відносно стійкий проти пірикуляріозу та стійкий до кореневої гнилі. Стійкий до осипання 9 балів, та вилягання 9 балів. Вихід крупи - 68,5 %, плівчастість - 18,0 %, склоподібність - 98,0 %, вихід цілого ядра - 92,0%

### 06009001 Преміум

Заявник: Інститут рису Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослини сорту з безбарвним колеоптиле, відсутньою чоловічою стерильністю, мають пряме положення стебел з середнім часом як викидання волоті, так і її досягання.

Стебло не здатен утворювати коліно, середніх довжини та товщини без антоціанового забарвлення міжвузлів та зі слабким антоціановим забарвлення вузлів.

Листки мають середні показники і довжини, і ширини з помірною інтенсивністю зеленого забарвлення, без антоціанового забарвлення листової пластинки і піхви, відсутньою або дуже слабкою опушеністю поверхні пластинки та середнім старінням (пожовтінням): на час збирання врожаю один листок зберігає свій колір.

Шийка та вушка - без антоціанового забарвлення. Язичок подвійний і безбарвний.

Прапорцевий листок як за раннього обстеження має пряме положення пластинки, а за пізнього – напівпряме.

Рослини сорту мають малу кількість волотей без остюків з короткою довжиною головної осі та прямим її вигином, без вторинного гілкування. Положення гілок волоті - пряме.

Колосок з білим забарвленням приймочки, має середньої довжини нижню стерильну колоскову луску солом'яного кольору.

Нижня квіткова луска з відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням як кіля та зони під верхівкою, так і самої верхівки, зі відсутнім або слабким її опушенням та білим кольором її верхівки.

Зернівка має середні довжину та ширину з наявною реакцією нижньої квіткової луски на фенол. Забарвлення зернівки у фенолі світле.

Обрушена зернівка білого кольору, без запаху, має напівверетеноподібну форму збоку, середні довжину та ширину.

Ендосперм – неглютинозний, має 11-15 % амілази та слабо дигестує (розщеплюється).

Маса 1000 розвинених зерен – середня (30 г).

Урожайність сорту в період випробування в зоні Степу - 100,0 ц/га. Відноситься до середньостиглої групи. Має подовжену форму зерна.  
Висота рослин - 81 см. Сорт відносно стійкий проти пірикуляріозу та стійкий до кореневої гнилі. Стійкий до осипання 9 балів, та відносно стійкий до вилягання 7 балів. Вихід крупи - 68,0 %, плівчастість - 18,1 %, склоподібність - 98,0 %, вихід цілого ядра - 90,0%

### ® 05009004 Серпневий

Заявник: Інститут рису Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут рису Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Рослини сорту з безбарвним колеоптиле, відсутньою чоловічою стерильністю, мають напівпряме положення стебел з раннім часом як викидання волоті, так і її досягання.

Стебло не здатен утворювати коліно, середніх довжини та товщини без антоціанового забарвлення міжвузлів та зі слабким антоціановим