

Ендосперм – неглютинозний, має 16-20 % амілази та слабо дигестує (розщеплюється).

Маса 1000 розвинених зерен – середня (30 г).

Урожайність сорту в період випробування в зоні Степу - 113,4 ц/га. Відноситься до середньостиглої групи. Має подовжену форму зерна. Висота рослин - 92 см. Сорт відносно стійкий проти пірикуляріозу та стійкий до кореневої гнилі. Стійкий до осипання 9 балів, та вилягання 9 балів. Вихід крупи - 68,5 %, плівчастість - 18,0 %, склоподібність - 98,0 %, вихід цілого ядра - 92,0%

### 06009001 Преміум

Заявник: Інститут рису Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослини сорту з безбарвним колеоптиле, відсутньою чоловічою стерильністю, мають пряме положення стебел з середнім часом як викидання волоті, так і її досягання.

Стебло не здатен утворювати коліно, середніх довжини та товщини без антоціанового забарвлення міжвузлів та зі слабким антоціановим забарвлення вузлів.

Листки мають середні показники і довжини, і ширини з помірною інтенсивністю зеленого забарвлення, без антоціанового забарвлення листової пластинки і піхви, відсутньою або дуже слабкою опушеністю поверхні пластинки та середнім старінням (пожовтінням): на час збирання врожаю один листок зберігає свій колір.

Шийка та вушка - без антоціанового забарвлення. Язичок подвійний і безбарвний.

Прапорцевий листок як за раннього обстеження має пряме положення пластинки, а за пізнього – напівпряме.

Рослини сорту мають малу кількість волотей без остюків з короткою довжиною головної осі та прямим її вигином, без вторинного гілкування. Положення гілок волоті - пряме.

Колосок з білим забарвленням приймочки, має середньої довжини нижню стерильну колоскову луску солом'яного кольору.

Нижня квіткова луска з відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням як кіля та зони під верхівкою, так і самої верхівки, зі відсутнім або слабким її опушенням та білим кольором її верхівки.

Зернівка має середні довжину та ширину з наявною реакцією нижньої квіткової луски на фенол. Забарвлення зернівки у фенолі світле.

Обрушена зернівка білого кольору, без запаху, має напівверетеноподібну форму збоку, середні довжину та ширину.

Ендосперм – неглютинозний, має 11-15 % амілази та слабо дигестує (розщеплюється).

Маса 1000 розвинених зерен – середня (30 г).

Урожайність сорту в період випробування в зоні Степу - 100,0 ц/га. Відноситься до середньостиглої групи. Має подовжену форму зерна. Висота рослин - 81 см. Сорт відносно стійкий проти пірикуляріозу та стійкий до кореневої гнилі. Стійкий до осипання 9 балів, та відносно стійкий до вилягання 7 балів. Вихід крупи - 68,0 %, плівчастість - 18,1 %, склоподібність - 98,0 %, вихід цілого ядра - 90,0%

### ® 05009004 Серпневий

Заявник: Інститут рису Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут рису Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Рослини сорту з безбарвним колеоптиле, відсутньою чоловічою стерильністю, мають напівпряме положення стебел з раннім часом як викидання волоті, так і її досягання.

Стебло не здатен утворювати коліно, середніх довжини та товщини без антоціанового забарвлення міжвузлів та зі слабким антоціановим