

Ендосперм – неглютинозний, має 16-20 % амілази та слабо дигестує (розщеплюється).

Маса 1000 розвинених зерен – середня (30 г).

Урожайність сорту в період випробування в зоні Степу - 113,4 ц/га. Відноситься до середньостиглої групи. Має подовжену форму зерна. Висота рослин - 92 см. Сорт відносно стійкий проти пірикуляріозу та стійкий до кореневої гнилі. Стійкий до осипання 9 балів, та вилягання 9 балів. Вихід крупи - 68,5 %, плівчастість - 18,0 %, склоподібність - 98,0 %, вихід цілого ядра - 92,0%

### 06009001 Преміум

Заявник: Інститут рису Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослини сорту з безбарвним колеоптиле, відсутньою чоловічою стерильністю, мають пряме положення стебел з середнім часом як викидання волоті, так і її досягання.

Стебло не здатен утворювати коліно, середніх довжини та товщини без антоціанового забарвлення міжвузлів та зі слабким антоціановим забарвлення вузлів.

Листки мають середні показники і довжини, і ширини з помірною інтенсивністю зеленого забарвлення, без антоціанового забарвлення листової пластинки і піхви, відсутньою або дуже слабкою опушеністю поверхні пластинки та середнім старінням (пожовтінням): на час збирання врожаю один листок зберігає свій колір.

Шийка та вушка - без антоціанового забарвлення. Язичок подвійний і безбарвний.

Прапорцевий листок як за раннього обстеження має пряме положення пластинки, а за пізнього – напівпряме.

Рослини сорту мають малу кількість волотей без остюків з короткою довжиною головної осі та прямим її вигином, без вторинного гілкування. Положення гілок волоті - пряме.

Колосок з білим забарвленням приймочки, має середньої довжини нижню стерильну колоскову луску солом'яного кольору.

Нижня квіткова луска з відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням як кіля та зони під верхівкою, так і самої верхівки, зі відсутнім або слабким її опушенням та білим кольором її верхівки.

Зернівка має середні довжину та ширину з наявною реакцією нижньої квіткової луски на фенол. Забарвлення зернівки у фенолі світле.

Обрушена зернівка білого кольору, без запаху, має напівверетеноподібну форму збоку, середні довжину та ширину.

Ендосперм – неглютинозний, має 11-15 % амілази та слабо дигестує (розщеплюється).

Маса 1000 розвинених зерен – середня (30 г).

Урожайність сорту в період випробування в зоні Степу - 100,0 ц/га. Відноситься до середньостиглої групи. Має подовжену форму зерна. Висота рослин - 81 см. Сорт відносно стійкий проти пірикуляріозу та стійкий до кореневої гнилі. Стійкий до осипання 9 балів, та відносно стійкий до вилягання 7 балів. Вихід крупи - 68,0 %, плівчастість - 18,1 %, склоподібність - 98,0 %, вихід цілого ядра - 90,0%

### ® 05009004 Серпневий

Заявник: Інститут рису Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут рису Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Рослини сорту з безбарвним колеоптиле, відсутньою чоловічою стерильністю, мають напівпряме положення стебел з раннім часом як викидання волоті, так і її досягання.

Стебло не здатен утворювати коліно, середніх довжини та товщини без антоціанового забарвлення міжвузлів та зі слабким антоціановим

забарвлення вузлів.

Листки середньої довжини, світло-зеленого забарвлення, без антоціанового забарвлення листової пластинки і піхви, слабкою опушеністю поверхні пластинки та раннім старінням (пожовтінням).

Шийка та вушка - без антоціанового забарвлення. Язичок подвійний, пурпурово-смугового кольору.

Прапорцевий листок як за раннього обстеження має напівпряме положення пластинки, а за пізнього – горизонтальне.

Рослини сорту мають середню кількість волотей без остюків з середньою довжиною головної осі та прямим її вигином, без вторинного гілкування. Положення гілок волоті - ві напівпрямого до прямого.

Колосок з білим забарвленням приймочки, має коротку нижню стерильну колоскову луску червоного кольору.

Нижня квіткова луска з відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням кіля та сильне зони під верхівкою і самої верхівки, слабким її опушенням та пурпуровим кольором її верхівки.

Зернівка має середні довжину та ширину з наявною реакцією нижньої квіткової луски на фенол. Забарвлення зернівки у фенолі світле.

Обрушена зернівка білого кольору, без аромату, має напівкруглу форму збоку, середні довжину та ширину.

Ендосперм – неглютинозний, має 11-15 % амілази та слабо дигестує (розщеплюється).

Урожайність сорту в період випробування в зоні Степу - 87,4 ц/га. Відноситься до ранньостиглої групи. Має подовжену форму зерна. Висота рослин - 88 см. Сорт відносно стійкий проти пірикуляріозу та стійкий до кореневої гнилі. Стійкий до осипання 9 балів, та відносно стійкий до вилягання 7 балів. Вихід крупи - 68,5 %, плівчастість - 17,5 %, склоподібність - 98,0 %, вихід цілого ядра - 92,0%

## Сільськогосподарські: олійні та прядивні

### Соняшник

#### ® 05017062 Антрацит

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннезнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Власник(и): Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннезнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук  
Закрите акціонерне товариство " Селена"

Підтримувач(и):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю помірна. Листок середнього розміру. Пухирчатість листка слабка, зубці помірні. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння пізній. Язичкові квітки помірно-жовтого кольору, середньої щільності, за довжиною короткі, вузько-яйцевидної форми. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, злегка охоплюють кошик. Рослина висока, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із сильним викривленням стебла. Кошик середнього розміру, сильно випуклої форми. Сім'янка широко-яйцеподібної форми, середнього розміру, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 25,0 ц/га, в зоні Лісостепу 26,6 ц/га. Потенційна урожайність 43,8 ц/га. Вміст жиру 49,8 - 50,0 %, білку 16,5-17,1 %, олеїнової кислоти 75,5 %. Вихід олії 1170 - 1310 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання, оипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

#### ® 06017013 Армада КЛ

Заявник: Мей Агро Тохумсулук Санаі ве Тісарет А.С

Власник(и): Мей Агро Тохумсулук Санаі ве Тісарет А.С

Підтримувач(и):