

забарвлення вузлів.

Листки середньої довжини, світло-зеленого забарвлення, без антоціанового забарвлення листової пластинки і піхви, слабкою опушеністю поверхні пластинки та раннім старінням (пожовтінням).

Шийка та вушка - без антоціанового забарвлення. Язичок подвійний, пурпурово-смугового кольору.

Прапорцевий листок як за раннього обстеження має напівпряме положення пластинки, а за пізнього – горизонтальне.

Рослини сорту мають середню кількість волотей без остюків з середньою довжиною головної осі та прямим її вигином, без вторинного гілкування. Положення гілок волоті - ві напівпрямого до прямого.

Колосок з білим забарвленням приймочки, має коротку нижню стерильну колоскову луску червоного кольору.

Нижня квіткова луска з відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням кіля та сильне зони під верхівкою і самої верхівки, слабким її опушенням та пурпуровим кольором її верхівки.

Зернівка має середні довжину та ширину з наявною реакцією нижньої квіткової луски на фенол. Забарвлення зернівки у фенолі світле.

Обрушена зернівка білого кольору, без аромату, має напівкруглу форму збоку, середні довжину та ширину.

Ендосперм – неглютинозний, має 11-15 % амілази та слабо дигестує (розщеплюється).

Урожайність сорту в період випробування в зоні Степу - 87,4 ц/га. Відноситься до ранньостиглої групи. Має подовжену форму зерна. Висота рослин - 88 см. Сорт відносно стійкий проти пірикуляріозу та стійкий до кореневої гнилі. Стійкий до осипання 9 балів, та відносно стійкий до вилягання 7 балів. Вихід крупи - 68,5 %, плівчастість - 17,5 %, склоподібність - 98,0 %, вихід цілого ядра - 92,0%

## Сільськогосподарські: олійні та прядивні

### Соняшник

#### ® 05017062 Антрацит

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Власник(и): Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук  
Закрите акціонерне товариство " Селена"

Підтримувач(и):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю помірна. Листок середнього розміру. Пухирчатість листка слабка, зубці помірні. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння пізній. Язичкові квітки помірно-жовтого кольору, середньої щільності, за довжиною короткі, вузько-яйцевидної форми. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, злегка охоплюють кошик. Рослина висока, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із сильним викривленням стебла. Кошик середнього розміру, сильно випуклої форми. Сім'янка широко-яйцеподібної форми, середнього розміру, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 25,0 ц/га, в зоні Лісостепу 26,6 ц/га. Потенційна урожайність 43,8 ц/га. Вміст жиру 49,8 - 50,0 %, білку 16,5-17,1 %, олеїнової кислоти 75,5 %. Вихід олії 1170 - 1310 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання, оипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

#### ® 06017013 Армада КЛ

Заявник: Мей Агро Тохумсулук Санаі ве Тісарет А.С

Власник(и): Мей Агро Тохумсулук Санаі ве Тісарет А.С

Підтримувач(и):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу сильна. Листок середнього розміру. Пухирчатість листка та зубці помірні. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння пізній. Язичкові квітки помірно-жовтого кольору, щільні, за довжиною короткі, вузько-яйцевидної форми. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, не охоплюють або злегка охоплюють кошик. Рослина висока, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Кошик великий, злегка випуклої форми. Сім'янка вузько-яйцеподібної форми, середнього розміру, за основним кольором сіра, смугастість на краях та між краями сім'янки відсутня або дуже слабка.

Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 28,6 ц/га, гарантована прибавка 2,1 ц/га; в зоні Лісостепу 27,8 ц/га. Потенційна урожайність 44,1 ц/га. Вміст жиру 49,2-50,4 %, білку 16,0-16,2%. Вихід олії 1251-1417 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, осипання, гербіцидів групи ІМІ; відносно стійкий проти посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

### ® 05017088 Геліамакс

Заявник: Р2н

Власник(и):

Підтримувач(и):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу слабка. Листок середнього розміру. Пухирчатість листка відсутня або дуже слабка, зубці дрібні. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки помірно-жовтого кольору, середньої щільності та довжини, вузько-яйцевидної форми. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, не охоплюють або злегка охоплюють кошик. Рослина висока, галуження відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик за розміром малий, сильно випуклої форми. Сім'янка видовженої форми, середнього розміру, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування в зоні Степу становила 28,1 ц/га, гарантована прибавка 1,6 ц/га; в зоні Лісостепу 31,5 ц/га, гарантована прибавка 3,7 ц/га. Потенційна урожайність 49,5 ц/га. Вміст жиру 50,8-51,6 %, білку 16,5-16,8%. Вихід олії 1498 - 1540 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами незначне.

### ® 05017087 Даллі

Заявник: Р2н

Власник(и):

Підтримувач(и):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу слабка. Листок середнього розміру. Пухирчатість листка відсутня або дуже слабка, зубці помірні. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки помірно-жовтого кольору, середньої щільності та довжини, вузько-яйцевидної форми. Зовнішні листки обгортки світло-зеленого кольору, не охоплюють або злегка охоплюють кошик. Рослина висока, галуження відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик середнього розміру, сильно випуклої форми. Сім'янка вузько-яйцеподібної форми, середнього розміру, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 29,8 ц/га, гарантована прибавка 3,4 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 30,2 ц/га, гарантована прибавка 2,4 ц/га. Потенційна урожайність 43,6 ц/га. Вміст жиру 51,2-51,4%, білку 15,8-16,6%, вихід олії 1573-1727 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

### 05017080 ЕС Лоліта

Заявник: Євраліс Семанс