

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу сильна. Листок середнього розміру. Пухирчатість листка та зубці помірні. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння пізній. Язичкові квітки помірно-жовтого кольору, щільні, за довжиною короткі, вузько-яйцевидної форми. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, не охоплюють або злегка охоплюють кошик. Рослина висока, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Кошик великий, злегка випуклої форми. Сім'янка вузько-яйцеподібної форми, середнього розміру, за основним кольором сіра, смугастість на краях та між краями сім'янки відсутня або дуже слабка.

Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 28,6 ц/га, гарантована прибавка 2,1 ц/га; в зоні Лісостепу 27,8 ц/га. Потенційна урожайність 44,1 ц/га. Вміст жиру 49,2-50,4 %, білку 16,0-16,2%. Вихід олії 1251-1417 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, осипання, гербіцидів групи ІМІ; відносно стійкий проти посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

® 05017088 Геліамакс

Заявник: Р2н

Власник(и):

Підтримувач(и):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу слабка. Листок середнього розміру. Пухирчатість листка відсутня або дуже слабка, зубці дрібні. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки помірно-жовтого кольору, середньої щільності та довжини, вузько-яйцевидної форми. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, не охоплюють або злегка охоплюють кошик. Рослина висока, галуження відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик за розміром малий, сильно випуклої форми. Сім'янка видовженої форми, середнього розміру, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування в зоні Степу становила 28,1 ц/га, гарантована прибавка 1,6 ц/га; в зоні Лісостепу 31,5 ц/га, гарантована прибавка 3,7 ц/га. Потенційна урожайність 49,5 ц/га. Вміст жиру 50,8-51,6 %, білку 16,5-16,8%. Вихід олії 1498 - 1540 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами незначне.

® 05017087 Даллі

Заявник: Р2н

Власник(и):

Підтримувач(и):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу слабка. Листок середнього розміру. Пухирчатість листка відсутня або дуже слабка, зубці помірні. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки помірно-жовтого кольору, середньої щільності та довжини, вузько-яйцевидної форми. Зовнішні листки обгортки світло-зеленого кольору, не охоплюють або злегка охоплюють кошик. Рослина висока, галуження відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик середнього розміру, сильно випуклої форми. Сім'янка вузько-яйцеподібної форми, середнього розміру, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 29,8 ц/га, гарантована прибавка 3,4 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 30,2 ц/га, гарантована прибавка 2,4 ц/га. Потенційна урожайність 43,6 ц/га. Вміст жиру 51,2-51,4%, білку 15,8-16,6%, вихід олії 1573-1727 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

05017080 ЕС Лоліта

Заявник: Євраліс Семанс

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю помірна до сильної. Листок середнього розміру, пухирчастість слабка, зубці та вушка помірні. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно жовтого кольору, вузькояйцевидної форми. Зовнішні листки обгортки за формою чітко видовжені, верхівка за довжиною середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика -напівобернене донизу разом із стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, широко- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 29,3 ц/га, гарантована прибавка 2,8 ц/га; в зоні Лісостепу 30,5 ц/га, гарантована прибавка 2,7 ц/га. Потенційна урожайність 44,5 ц/га. Вміст жиру 50,0-51,3 %, білку 15,9-16,3 %. Вихід олії 1416 - 1555 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання, осипання, посухи; стійкий до гербіцидів групи ІМІ. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

04017012 ЕС Пріміс Євраліс

Заявник: Євраліс Семанс

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю слабка. Листок за розміром середній до великого. Пухирчатість листка слабка, зубці помірні. Опушеність верхівки стебла сильна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки світло-жовтого кольору, середньої щільності та довжини, веретенувидної форми. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик середнього розміру, плескатої форми, положення кошика обернене донизу разом із сильним викривленням стебла. Сім'янка широко-яйцеподібної форми, середнього розміру, за основним кольором чорна, розмір середній, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування в зоні Степу становила 29,4 ц/га, гарантована прибавка 2,9 ц/га. Потенційна урожайність 44,2 ц/га. Вміст жиру 49,5 %, білку 17,3%. Вихід олії 1394 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

04017014 ЕС Біба

Заявник: Євраліс Семанс

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю сильна. Листок за розміром середній до великого. Пухирчатість листка слабка, зубці помірні. Опушеність верхівки стебла сильна до дуже сильної. Час цвітіння середній. Язичкові квітки помірно-жовтого кольору, середньої щільності та довжини, вузько-яйцевидної форми. Рослина висока, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із сильним викривленням стебла. Кошик середнього розміру, злегка випуклої форми. Сім'янка широко-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, розмір середній, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування в зоні Степу становила 28,2 ц/га, гарантована прибавка 1,8 ц/га. Потенційна урожайність 46,7 ц/га. Вміст жиру 49,4 %, білку 17,1%. Вихід олії 1378 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.