

05017068 Ендуро

Заявник: КВС ЗААТ АГ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилію помірна. Листок середнього розміру, пухирчастість слабка, зубці та вушка помірні. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння пізній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно жовтого кольору, вузькояйцевидної форми. Зовнішні листки обгортки за формою чітко видовжені, верхівка за довжиною середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика - напівобернене донизу разом із стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки відсутня або дуже слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування в зоні Степу становила 31,3 ц/га, гарантована прибавка 4,8 ц/га. Потенційна урожайність 52,0 ц/га. Вміст жиру 49,9 %, білку 16,8%. Вихід олії 1408 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами незначне.

06017021 Жалон

Заявник: Євраліс Семанс

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилію слабка до помірної. Листок за розміром середній до великого. Пухирчатість листка помірна, зубці грубі. Опушеність верхівки стебла сильна до дуже сильної. Час цвітіння середній. Язичкові квітки світло-жовтого кольору, середньої щільності та довжини, вузько-яйцевидної форми. Рослина висока, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Кошик середнього розміру, злегка випуклої форми. Сім'янка широко-яйцеподібної форми, середнього розміру, за основним кольором чорна, розмір середній, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 28,6 ц/га, гарантована прибавка 2,2 ц/га; в зоні Лісостепу 29,6 ц/га, гарантована прибавка 1,8 ц/га. Потенційна урожайність 46,8 ц/га. Вміст жиру 51,5 - 52,2%, білку 15,1-16,7%. Вихід олії 1403-1450 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами незначне.

® 05017054 Зорепад

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилію слабка. Листок великий. Пухирчатість листка слабка, зубці грубі. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки помірно-жовтого кольору, середньої щільності та довжини, вузько-яйцевидної форми. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, злегка охоплюють кошик. Рослина висока, галуження відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом із стеблом. Кошик середнього розміру, злегка випуклої форми. Сім'янка широко-яйцеподібної форми, середнього розміру, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок

сірий.

Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 25,4 ц/га, в зоні Лісостепу 26,9 ц/га. Потенційна урожайність 45,4 ц/га. Вміст жиру 49,3-50,2 %, білку 16,6-16,9 %, олеїнової кислоти 66,3 %. Вихід олії 1122-1158 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

® 05017098 Каліда

Заявник: Маїсадур Семанс

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилію помірна. Листок середнього розміру. Пухирчатість листка відсутня або дуже слабка, зубці дрібні. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння пізній. Язичкові квітки помірно-жовтого кольору, щільні, за довжиною середні, вузько-яйцевидної форми. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, не охоплюють або злегка охоплюють кошик. Рослина висока, галуження відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик середнього розміру, плескатої форми. Сім'янка широко-яйцеподібної форми, середнього розміру, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 28,0 ц/га, гарантована прибавка 3,5 ц/га; в зоні Лісостепу 31,6 ц/га, гарантована прибавка - 4,5 ц/га. Потенційна урожайність - 46,7 ц/га. Вміст жиру 49,8 - 50,6 %, білку 15,7 - 16,0%. Вихід олії 1552 - 1694 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

05017085 Кодіфло

Заявник: Кассад Семанс

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилію слабка. Листок середнього розміру, пухирчастість слабка, зубці та вушка помірні. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно жовтого кольору, вузькоюяйцевидної форми. Зовнішні листки обгортки за формою чітко видовжені, верхівка за довжиною середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина висока, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 30,2 ц/га, гарантована прибавка 3,7 ц/га; в зоні Лісостепу 31,8 ц/га, гарантована прибавка 4,0 ц/га. Потенційна урожайність 47,1 ц/га. Вміст жиру 51,5-53,1%, білку 15,0-16,4%. Вихід олії 1571 -1584 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами незначне.

05017095 МН 5203

Заявник: Монсанта Інтернешнл Сьорл

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилію слабка. Листок середнього розміру, пухирчастість відсутня або дуже слабка, зубці та