

вушка помірні. Опушення верхівки стебла дуже сильне. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно жовтого кольору, веретеновидної форми. Зовнішні листки обгортки за формою чітко видовжені, верхівка за довжиною коротка, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки світлий. Рослина висока, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 28,9 ц/га, гарантована прибавка 2,5 ц/га; в зоні Лісостепу 30,4 ц/га, гарантована прибавка 2,6 ц/га. Потенційна урожайність 43,0 ц/га. Вміст жиру 50,5-51,0 %, білку 15,6 - 15,9 %, олеїнової кислоти 82,9 %. Вихід олії 1462 - 1464 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання, оипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

### ® 05017096 Мараска

Заявник: Маїсадур Семанс

Власник(и):

Підтримувач(і):

Антоціанове забарвлення гіпокотилу відсутнє. Листок великого розміру. Пухирчатість листка слабка, зубці дрібні. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки помірно-жовтого кольору, середньої щільності та довжини, вузько-яйцевидної форми. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, дуже охоплюють кошик. Рослина висока, галуження відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом із стеблом. Кошик середнього розміру, сильно випуклої форми. Сім'янка вузько-яйцеподібної форми, середнього розміру, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування в зоні Степу становила 27,6 ц/га, гарантована прибавка 3,1 ц/га; в зоні Лісостепу 30,2 ц/га, гарантована прибавка 3,1 ц/га. Потенційна урожайність 42,5 ц/га. Вміст жиру 50,1%, білку 16,1-16,5%. Вихід олії 1398 - 1536 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

### 05017094 МН 4318

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу помірна до сильної. Листок середнього розміру, пухирчастість слабка, зубці та вушка помірні. Опушення верхівки стебла дуже сильне. Час цвітіння середній. Язичкові квітки довгі, середньої щільності, помірно жовтого кольору, веретеновидної форми. Зовнішні листки обгортки за формою чітко округлі, верхівка довга, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина висока, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, широко - яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 29,2 ц/га, гарантована прибавка 2,8 ц/га; в зоні Лісостепу 30,8 ц/га, гарантована прибавка 3,0 ц/га. Потенційна урожайність 46,3 ц/га. Вміст жиру 49,0 - 49,4%, білку 16,9 - 17,2%. Вихід олії 1352-1501 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами незначне.

### ® 05017097 МАС 92В

Заявник: Маїсадур Семанс

Власник(и):

Підтримувач(и):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилію слабка. Листок середнього розміру. Пухирчатість листка відсутня або дуже слабка, зубці дрібні. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння пізній. Язичкові квітки помірно-жовтого кольору, середньої щільності та довжини, вузько-яйцевидної форми. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, не охоплюють або злегка охоплюють кошик. Рослина висока, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик середнього розміру, сильно випуклої форми. Сім'янка вузько-яйцеподібної форми, середнього розміру, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 29,6 ц/га, гарантована прибавка 5,1 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 31,9 ц/га, гарантована прибавка 4,8 ц/га. Потенційна урожайність 43,1 ц/га. Вміст жиру 48,6-50,5%, білку 16,2-17,4%, вихід олії 1480-1790 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

### 05017081 Наллімі

Заявник: Р2н

Власник(и):

Підтримувач(и):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилію помірна до сильної. Листок середнього розміру. Пухирчатість листка помірна, зубці грубі. Опушеність верхівки стебла помірна до сильної. Час цвітіння середній. Язичкові квітки світло-жовтого кольору, середньої щільності та довжини, вузько-яйцевидної форми. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, не охоплюють або злегка охоплюють кошик. Рослина за висотою середня до високої, галуження відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик середнього розміру, сильно випуклої форми. Сім'янка вузько-яйцеподібної форми, середнього розміру, за основним кольором чорна, розмір середній, смугастість на краях та між краями сім'янки слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 26,9 ц/га, гарантована прибавка 0,4 ц/га; в зоні Лісостепу 27,1 ц/га. Потенційна урожайність 40,4 ц/га. Вміст жиру 49,1-52,1 %, білку 16,1 - 16,6 %. Вихід олії 1377 -1495 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання, осипання, посухи; стійкий до гербіцидів групи ІМІ. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

### ® 05017074 ПР64Г32

Заявник: Піонер Семена Холдінг ГезмБХ

Власник(и):

Підтримувач(и):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилію слабка. Листок середнього розміру. Пухирчатість листка слабка, зубці помірні. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки помірно-жовтого кольору, середньої щільності та довжини, вузько-яйцевидної форми. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, злегка охоплюють кошик. Рослина висока, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Кошик середнього розміру, сильно випуклої форми. Сім'янка широко-яйцеподібної форми, середнього розміру, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування в зоні Степу становила 29,2 ц/га, гарантована прибавка 1,1 ц/га; в зоні Лісостепу 28,5 ц/га. Потенційна урожайність 42,2 ц/га. Вміст жиру 50,1-51,7 %, білку 15,7-16,8 %, олеїнової кислоти 88,1 %. Вихід олії 1287 - 1312 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.