

Підтримувач(и):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилію слабка. Листок середнього розміру. Пухирчатість листка відсутня або дуже слабка, зубці дрібні. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння пізній. Язичкові квітки помірно-жовтого кольору, середньої щільності та довжини, вузько-яйцевидної форми. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, не охоплюють або злегка охоплюють кошик. Рослина висока, галузнення відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик середнього розміру, сильно випуклої форми. Сім'янка вузько-яйцеподібної форми, середнього розміру, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 29,6 ц/га, гарантована прибавка 5,1 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 31,9 ц/га, гарантована прибавка 4,8 ц/га. Потенційна урожайність 43,1 ц/га. Вміст жиру 48,6-50,5%, білку 16,2-17,4%, вихід олії 1480-1790 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

### 05017081 Наллімі

Заявник: Р2н

Власник(и):

Підтримувач(и):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилію помірна до сильної. Листок середнього розміру. Пухирчатість листка помірна, зубці грубі. Опушеність верхівки стебла помірна до сильної. Час цвітіння середній. Язичкові квітки світло-жовтого кольору, середньої щільності та довжини, вузько-яйцевидної форми. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, не охоплюють або злегка охоплюють кошик. Рослина за висотою середня до високої, галузнення відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик середнього розміру, сильно випуклої форми. Сім'янка вузько-яйцеподібної форми, середнього розміру, за основним кольором чорна, розмір середній, смугастість на краях та між краями сім'янки слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 26,9 ц/га, гарантована прибавка 0,4 ц/га; в зоні Лісостепу 27,1 ц/га. Потенційна урожайність 40,4 ц/га. Вміст жиру 49,1-52,1 %, білку 16,1 - 16,6 %. Вихід олії 1377 -1495 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання, осипання, посухи; стійкий до гербіцидів групи ІМІ. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

### ® 05017074 ПР64Г32

Заявник: Піонер Семена Холдінг ГезмБХ

Власник(и):

Підтримувач(и):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилію слабка. Листок середнього розміру. Пухирчатість листка слабка, зубці помірні. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки помірно-жовтого кольору, середньої щільності та довжини, вузько-яйцевидної форми. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, злегка охоплюють кошик. Рослина висока, галузнення відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Кошик середнього розміру, сильно випуклої форми. Сім'янка широко-яйцеподібної форми, середнього розміру, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування в зоні Степу становила 29,2 ц/га, гарантована прибавка 1,1 ц/га; в зоні Лісостепу 28,5 ц/га. Потенційна урожайність 42,2 ц/га. Вміст жиру 50,1-51,7 %, білку 15,7-16,8 %, олеїнової кислоти 88,1 %. Вихід олії 1287 - 1312 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.