

® 06017017 ПСФ - 03

Заявник: Просід Інк.

Власник(и): Просід Інк.

Підтримувач(и):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю слабка. Листок середнього розміру. Пухирчатість листка відсутня або дуже слабка, зубці помірні. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки помірно-жовтого кольору, середньої щільності та довжини, вузько-яйцевидної форми. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, злегка охоплюють кошик. Рослина висока, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик середнього розміру, сильно випуклої форми. Сім'янка широко-яйцеподібної форми, середнього розміру, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки відсутня або дуже слабка.

Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 24,7 ц/га. Потенційна урожайність 41,4 ц/га. Вміст жиру 49,0%, білку 16,4%. Вихід олії 1258 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, осипання, гербіцидів групи ІМІ; відносно стійкий проти посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

03017013 Помар РМ

Заявник: Євраліс Семанс

Власник(и):

Підтримувач(и):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю помірна до сильної. Листок великого розміру. Пухирчатість листка слабка, зубці помірні. Опушеність верхівки стебла дуже сильна. Час цвітіння середній до пізнього. Язичкові квітки помірно-жовтого кольору, середньої щільності та довжини, веретеновидної форми. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, не охоплюють або злегка охоплюють кошик. Рослина висока, галуження відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик середнього розміру, сильно випуклої форми. Сім'янка вузько-яйцеподібної форми, середнього розміру, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування в зоні Степу становила 29,3 ц/га, в зоні Лісостепу 30,7 ц/га; гарантована прибавка 2,9 ц/га. Потенційна урожайність 41,5 ц/га. Вміст жиру 48,8-49,1%, білку 16,4-17,2%. Вихід олії 1344 - 1440 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

® 05017076 ПР63А62

Заявник: Піонер Семена Холдінг ГезмБХ

Власник(и):

Підтримувач(и):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю помірна. Листок середнього розміру. Пухирчатість листка слабка, зубці помірні. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки помірно-жовтого кольору, середньої щільності та довжини, вузько-яйцевидної форми. Зовнішні листки обгортки світло-зеленого кольору, злегка охоплюють кошик. Рослина висока, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Кошик середнього розміру, злегка випуклої форми. Сім'янка вузько-яйцеподібної форми, середнього розміру, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 30,4 ц/га, гарантована прибавка 2,3 ц/га; по зоні Лісостепу 30,0 ц/га, гарантована прибавка 1,3 ц/га. Потенційна урожайність 46,1 ц/га. Вміст жиру 50,0-50,4 %, білку 16,5 - 16,9%. Вихід олії 1558 - 1650 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами незначне.

05017050 Принц

Заявник: Заатбау Лінц рег.Ген.м.б.Х

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю слабка. Листок середнього розміру, пухирчастість відсутня або дуже слабка, зубці дрібні, вушка помірні. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно жовтого кольору, вузькояйцевидної форми. Зовнішні листки обгортки за формою чітко видовжені але й чітко округлі, злегка охоплюють кошик. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика - напівобернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько - яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування в зоні Степу становила 28,0 ц/га, гарантована прибавка - 3,5 ц/га; в зоні Лісостепу - 29,2, гарантована прибавка - 2,1 ц/га. Потенційна урожайність 42,3 ц/га. Вміст жиру 50,6-51,2%, білку 15,8- 16,2%. Вихід олії 1576-1582 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання, осипання, посухи. Хворобами та шкідниками уражувався в незначній мірі.

06017005 Санлука РМ

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю помірна. Листок за розміром середній до великого. Пухирчатість листка відсутня або дуже слабка, зубці дрібні до помірних. Опушеність верхівки стебла слабка до помірної. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки світло-жовтого кольору, середньої щільності та довжини, вузько-яйцевидної форми. Рослина висока, галуження відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик середнього розміру, сильно випуклої форми. Сім'янка вузько-яйцеподібної форми, середнього розміру, за основним кольором чорна, розмір середній, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 30,0 ц/га, гарантована прибавка 2,5 ц/га; в зоні Лісостепу 29,3 ц/га, гарантована прибавка 1,6 ц/га. Потенційна урожайність 47,3 ц/га . Вміст жиру 48,7-49,0%, білку 17,0-17,5%. Вихід олії 1394 - 1540 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

® 05017064 Селянин

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Власник(и): Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук
Закрите акціонерне товариство "Селена"

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю помірна. Листок середнього розміру. Пухирчатість листка слабка, зубці грубі.