

Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 30,4 ц/га, гарантована прибавка 2,3 ц/га; по зоні Лісостепу 30,0 ц/га, гарантована прибавка 1,3 ц/га. Потенційна урожайність 46,1 ц/га. Вміст жиру 50,0-50,4 %, білку 16,5 - 16,9%. Вихід олії 1558 - 1650 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами незначне.

05017050 Принц

Заявник: Заатбау Лінц рег.Ген.м.б.Х

Власник(и):

Підтримувач(и):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю слабка. Листок середнього розміру, пухирчастість відсутня або дуже слабка, зубці дрібні, вушка помірні. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої довжини та щільноті, помірно жовтого кольору, вузькояйцевидної форми. Зовнішні листки обгортки за формує чітко видовжені але й чітко округлі, злегка охоплюють кошик. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика - напівобернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько - яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування в зоні Степу становила 28,0 ц/га, гарантована прибавка - 3,5 ц/га; в зоні Лісостепу - 29,2, гарантована прибавка - 2,1 ц/га. Потенційна урожайність 42,3 ц/га. Вміст жиру 50,6-51,2%, білку 15,8- 16,2%. Вихід олії 1576-1582 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання, осипання, посухи. Хворобами та шкідниками уражувався в незначній мірі.

06017005 Санлука РМ

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Власник(и):

Підтримувач(и):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю помірна. Листок за розміром середній до великого. Пухирчатість листка відсутня або дуже слабка, зубці дрібні до помірних. Опушеність верхівки стебла слабка до помірної. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки світло-жовтого кольору, середньої щільноті та довжини, вузько-яйцевидної форми. Рослина висока, галуження відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик середнього розміру, сильно випуклої форми. Сім'янка вузько-яйцеподібної форми, середнього розміру, за основним кольором чорна, розмір середній, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 30,0 ц/га, гарантована прибавка 2,5 ц/га; в зоні Лісостепу 29,3 ц/га, гарантована прибавка 1,6 ц/га. Потенційна урожайність 47,3 ц/га . Вміст жиру 48,7-49,0%, білку 17,0-17,5%. Вихід олії 1394 - 1540 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

® 05017064 Селянин

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Власник(и): Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Закрите акціонерне товариство "Селена"

Підтримувач(и):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю помірна. Листок середнього розміру. Пухирчатість листка слабка, зубці грубі.

Опушеність верхівки стебла сильна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки помірно-жовтого кольору, середньої щільності та довжини, вузько-яйцевидної форми. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, злегка охоплюють кошик. Рослина висока, галуження відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик середнього розміру, сильно випуклої форми. Сім'янка широко-яйцеподібної форми, середнього розміру, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування в зоні Степу становила 27,3 ц/га, гарантована прибавка 0,8 ц/га. Потенційна урожайність 52,1 ц/га. Вміст жиру 52,4%, білку 15,8%. Вихід олії 1531 кг/га. Гіbrid відносно стійкий проти вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами незначне.

® 05017063 Сюжет

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук
 Власник(и): Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук
 Закрите акціонерне товариство "Селена"

Підтримувач(и):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю помірна. Листок середнього розміру. Пухирчатість листка та зубці помірні. Опушеність верхівки стебла сильна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки помірно-жовтого кольору, середньої щільності та довжини, вузько-яйцевидної форми. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, злегка охоплюють кошик. Рослина висока, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Кошик середнього розміру, сильно випуклої форми. Сім'янка вузько-яйцеподібної форми, середнього розміру, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування в зоні Степу становила 28,6 ц/га, гарантована прибавка 2,2 ц/га. Потенційна урожайність 44,1 ц/га. Вміст жиру 51,4%, білку 16,5%. Вихід олії 1463 кг/га. Гіbrid відносно стійкий проти вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами незначне.

® 05017082 Теллія

Заявник: Р2н

Власник(и):

Підтримувач(и):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю слабка. Листок середнього розміру. Пухирчатість листка слабка, зубці помірні. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння пізній. Язичкові квітки помірно-жовтого кольору, середньої щільності та довжини, вузько-яйцевидної форми. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, злегка охоплюють кошик. Рослина висока, галуження відсутнє. Положення кошика обернене напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик середнього розміру, злегка випуклої форми. Сім'янка вузько-яйцеподібної форми, середнього розміру, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 29,1 ц/га, гарантована прибавка 1,1 ц/га; в зоні Лісостепу 30,0 ц/га, гарантована прибавка 1,3 ц/га. Потенційна урожайність 42,5 ц/га. Вміст жиру 50,8 - 51,1%, білку 16,0 - 16,2%. Вихід олії 1418 - 1526 кг/га. Гіbrid відносно стійкий проти вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами незначне.