

Опушеність верхівки стебла сильна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки помірної жовтого кольору, середньої щільності та довжини, вузько-яйцевидної форми. Зовнішні листки обгортки помірної зеленого кольору, злегка охоплюють кошик. Рослина висока, галуження відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик середнього розміру, сильно випуклої форми. Сім'янка широко-яйцеподібної форми, середнього розміру, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування в зоні Степу становила 27,3 ц/га, гарантована прибавка 0,8 ц/га. Потенційна урожайність 52,1 ц/га. Вміст жиру 52,4%, білку 15,8%. Вихід олії 1531 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами незначне.

® 05017063 Сюжет

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннізнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук
Власник(и): Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннізнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук
Закрите акціонерне товариство "Селена"

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилію помірної. Листок середнього розміру. Пухирчатість листка та зубці помірні. Опушеність верхівки стебла сильна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки помірної жовтого кольору, середньої щільності та довжини, вузько-яйцевидної форми. Зовнішні листки обгортки помірної зеленого кольору, злегка охоплюють кошик. Рослина висока, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Кошик середнього розміру, сильно випуклої форми. Сім'янка вузько-яйцеподібної форми, середнього розміру, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування в зоні Степу становила 28,6 ц/га, гарантована прибавка 2,2 ц/га. Потенційна урожайність 44,1 ц/га. Вміст жиру 51,4%, білку 16,5%. Вихід олії 1463 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами незначне.

® 05017082 Телліа

Заявник: Р2н

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилію слабка. Листок середнього розміру. Пухирчатість листка слабка, зубці помірні. Опушеність верхівки стебла помірної. Час цвітіння пізній. Язичкові квітки помірної жовтого кольору, середньої щільності та довжини, вузько-яйцевидної форми. Зовнішні листки обгортки помірної зеленого кольору, злегка охоплюють кошик. Рослина висока, галуження відсутнє. Положення кошика обернене напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик середнього розміру, злегка випуклої форми. Сім'янка вузько-яйцеподібної форми, середнього розміру, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 29,1 ц/га, гарантована прибавка 1,1 ц/га; в зоні Лісостепу 30,0 ц/га, гарантована прибавка 1,3 ц/га. Потенційна урожайність 42,5 ц/га. Вміст жиру 50,8 - 51,1%, білку 16,0 - 16,2%. Вихід олії 1418 - 1526 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами незначне.