

смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий. 236

Середня урожайність за період випробування в зоні Степу становила 24,4 ц/га. Потенційна урожайність 39,8 ц/га. Вміст жиру 50,8%, білку 15,9%. Вихід олії 1340 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

## Соя

### 05018010 Говерла

Заявник: Коломийська дослідна станція Івано-Франківського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(и):

Гіпокотиль у рослин сорту з наявним антоціановим забарвленням. Рослини середньої висоти, мають проміжний тип росту, з жовто-коричневим опушенням, відсутнім або дуже слабким ступенем завивання стебла, напівстиснуту форму куща, середній час початку цвітіння і ранній достигання з наявним опадання листя.

Стебло середньої товщини з середньою кількістю вузлів, нефасційоване. Листок помірно зеленого кольору з слабким ступенем пухирчастості. Середній листочок середній за розміром, овальної форми із загостреною формою верхівки.

Квітка фіолетова. Біб коричневий, має серповидну форму та середні показники і довжини, і ширини.

Насінина овально-видовженої форми з основним жовтим забарвленням оболонки та темно-коричневим рубчиком. Рубчик лінійної форми без вічка та малюнка (смужок) навколо нього, має темно-коричнє забарвлення. Маса 1000 зерен – велика.

Напрямок використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу – 18,0 ц/га, Лісостепу – 24,1 ц/га з вмістом жиру відповідно 22,1% і 23,5%, білку – 38,0% і 37,9%.

Висота прикріплення нижнього бобу – 11,8-13,0 см. Маса 1000 насінин – 169,8 г.

Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами, відносно стійкий до осипання.

### 05018020 Галина

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Власник(и):

Підтримувач(и):

Гіпокотиль у рослин сорту з відсутнім антоціановим забарвленням. Рослини з висотою від середньої до високої, мають проміжний тип росту, сіре опушення, середній ступінь завивання стебла, проміжну форму куща, середньоранній і час початку і цвітіння, і достигання з наявним опадання листя.

Стебло середньої товщини з середньою кількістю вузлів, нефасційоване. Листок помірно зеленого кольору зі слабким ступенем пухирчастості. Середній листочок середній за розміром, має овальну форму та заокруглену форму верхівки.

Квітка біла. Біб світло-коричневий, має серповидну форму та середні і довжину, і ширину.

Насінина овальної форми з основним жовтим забарвленням як оболонки так і рубчика. Рубчик лінійної форми з наявним вічком та відсутнім малюнком (смужками) навколо нього.

□ Маса 1000 зерен – середня.

Напрямок використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу – 19,9 ц/га з вмістом жиру 20,9%, білку – 38,5%.

Висота прикріплення нижнього бобу – 14,8 см. Маса 1000 насінин – 158,3 г.  
Стійкий до вилягання, осипання, посухи, ураження хворобами.

### 05018011 Даная

Заявник: Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гіпокотиль у рослин сорту з відсутнім антоціановим забарвленням. Рослини з висотою від середньої до високої, мають індетермінантний тип росту, з сірим опушенням, відсутнім або дуже слабким ступенем завивання стебла, проміжну форму куща, середній час початку цвітіння і середньо-пізній достигання з наявним опаданням листя.

Стебло тонке з середньою кількістю вузлів, нефасційоване. Листок помірно зеленого кольору з слабким ступенем пухирчастості. Середній листочок середній за розміром, клиновидної форми із загостреною формою верхівки.

Квітка біла. Біб світлий (пісочний), має серповидну форму та середньої довжини, вузькі.

Насінина округло-випуклої форми з основним світло-коричневим забарвленням оболонки та світло-коричневим рубчиком. Рубчик овальної форми без вічка та малюнка (смужок) навколо нього.

Маса 1000 зерен – середня.

Напрямок використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу – 19,7 ц/га, Лісостепу – 27,9 ц/га з вмістом жиру відповідно 20,9% і 21,6%, білку – 38,9% і 38,0%.

Висота прикріплення нижнього бобу – 12,0-15,5 см. Маса 1000 насінин – 167,1 г.

Стійкий до вилягання, посухи, осипання, ураження хворобами.

### 05018017 Ірина

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гіпокотиль у рослин сорту з відсутнім антоціановим забарвленням. Рослини з висотою від середньої до високої, мають індетермінантний тип росту, сіре опушення, відсутній або дуже слабкий ступінь завивання стебла, проміжну форму куща, середній час початку цвітіння, і достигання з наявним опаданням листя.

Стебло середньої товщини з середньою кількістю вузлів, нефасційоване. Листок помірно зеленого кольору зі слабким ступенем пухирчастості. Середній листочок середній за розміром, має овальну форму та заокруглену форму верхівки.

Квітка біла. Біб світлий (пісочний), має серповидну форму та середні довжину, і ширину.

Насінина кулястої форми з основним жовтим забарвленням оболонки та жовтим рубчиком. Рубчик лінійної форми без вічка та малюнка (смужок) навколо нього.

Маса 1000 зерен – середня.

Напрямок використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу – 20,1 ц/га з вмістом жиру 20,6%, білку – 39,0%.

Висота прикріплення нижнього бобу – 16,3 см. Маса 1000 насінин – 162,4 г.

Стійкий до вилягання, осипання, посухи, ураження хворобами.