

## 05018019 Поема

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гіпокотиль у рослин сорту з наявним антоціановим забарвленням. Рослини з висотою від середньої до високої, мають індетермінантний тип росту, сіре опушення, середній ступінь завивання стебла, проміжну форму куща, середні час початку і цвітіння, і досягання з наявним опадання листя.

Стебло середньої товщини з середньою кількістю вузлів, нефасційоване. Листок помірно зеленого кольору зі слабким ступенем пухирчастості. Середній листочок середній за розміром, овальної форми із заокругленою формою верхівки.

Квітка фіолетова. Біб світло-коричневий, має серповидну форму та середню і довжину, і ширину.

Насіння кулястої форми з основним жовтим забарвленням як оболонки, так і рубчика. Рубчик лінійної форми без вічка та малюнка (смужок) навколо нього.

Маса 1000 зерен – середня.

Напрямок використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу – 27,2 ц/га з вмістом жиру 21,5%, білку – 38,0%.

Висота прикріплення нижнього бобу – 16,7 см. Маса 1000 насінин – 150,6 г.

Стойкий до осипання, ураження хворобами, відносно стійкий до вилягання, посухи.

## Ріпак ярий

### 06016002 Антоціан

Заявник: Національний аграрний університет

Власник(и):

Підтримувач(і):

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля середньої ширини і довжини. Зубчастість краю листка помірна, листок середньої довжини і ширини, часток - багато. Довжина черешка листка середня. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середньої довжини з середнім зубцем. Час цвітіння середній.

Урожайність за роки випробування (2006-2008) у зоні Степу – 20,8 ц/га, Лісостепу – 23,1 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,5-44,9%, білку – в межах 23,2-25,6%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – в межах 0,6-0,7%.

Стойкість до вилягання – в межах 8,4-9,0; посухи – 7,9; осипання – в межах 7,4-8,0 балів.

Стойкість до ураження пероноспорозом – 9,0; бактеріозом – в межах 8,2-9,0 балів. Стойкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – в межах 8,4-8,7 бала.

### 05016022 Марине

Заявник: Івано - Франківський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля середньої ширини і довжини. Зубчастість краю листка помірна, листок середньої довжини і ширини з



середньою кількістю часток. Довжина черешка листка середня. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середньої довжини з довгим зубцем. Час цвітіння пізній.

Урожайність за роки випробування (2006-2008) у зоні Степу – 19,9 ц/га. Вміст жиру – 43,8%, білку – 25,8%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – 0,7%.

Стійкість до вилягання – 9,0; посухи – 7,7; осипання – 8,2 бала.

Стійкість до ураження пероноспорозом – 9,0; бактеріозом – 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – 7,8 бала.

### ® 06016008 Хузар

Заявник: Годовля рослин Стрельце Сполка з о.о.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля середньої ширини і довжини. Зубчастість краю листка помірна, листок середньої довжини і ширини з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка середня. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середньої довжини з довгим зубцем. Час цвітіння середній.

Урожайність за роки випробування (2006-2008) у зоні Степу – 22,1 ц/га. Вміст жиру – 44,2%, білку – 23,6%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – 0,7%.

Стійкість до вилягання – 9,0; посухи – 7,9; осипання – 8,6 бала.

Стійкість до ураження пероноспорозом – 9,0; бактеріозом – 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – 8,4 бала.

### ® 05016029 Хантер

Заявник: Рапс Г6Р насінневе господарство

Власник(и): Рапс Г6Р насінневе господарство

Підтримувач(і):

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля середньої ширини і довжини. Зубчастість краю листка помірна, листок середньої довжини і ширини з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка середня. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середньої довжини з середнім зубцем. Час цвітіння середній.

Урожайність за роки випробування (2006-2008) у зоні Степу – 23,9 ц/га, Лісостепу – 21,9 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,8-45,2%, білку – в межах 23,7-25,9%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – 0,7%.

Стійкість до вилягання – в межах 8,3-8,8; посухи – в межах 7,7-7,9; осипання – в межах 7,5-8,4 бала.

Стійкість до ураження пероноспорозом – в межах 8,2-9,0; бактеріозом – 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – в межах 8,4-8,8 бала.

## Льон кудряш

### 07094001 Віра

Заявник: ДПДГ "Асканійське" Інституту олійних культур Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):