

середньою кількістю часток. Довжина черешка листка середня. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середньої довжини з довгим зубцем. Час цвітіння пізній.

Урожайність за роки випробування (2006-2008) у зоні Степу – 19,9 ц/га. Вміст жиру – 43,8%, білку – 25,8%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – 0,7%.

Стійкість до вилягання – 9,0; посухи – 7,7; осипання – 8,2 бала.

Стійкість до ураження пероноспорозом – 9,0; бактеріозом – 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – 7,8 бала.

® 06016008 Хузар

Заявник: Годовля рослин Стрельце Сполка з о.о.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля середньої ширини і довжини. Зубчастість краю листка помірна, листок середньої довжини і ширини з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка середня. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середньої довжини з довгим зубцем. Час цвітіння середній.

Урожайність за роки випробування (2006-2008) у зоні Степу – 22,1 ц/га. Вміст жиру – 44,2%, білку – 23,6%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – 0,7%.

Стійкість до вилягання – 9,0; посухи – 7,9; осипання – 8,6 бала.

Стійкість до ураження пероноспорозом – 9,0; бактеріозом – 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – 8,4 бала.

® 05016029 Хантер

Заявник: Рапс Г6Р насінневе господарство

Власник(и): Рапс Г6Р насінневе господарство

Підтримувач(і):

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля середньої ширини і довжини. Зубчастість краю листка помірна, листок середньої довжини і ширини з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка середня. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середньої довжини з середнім зубцем. Час цвітіння середній.

Урожайність за роки випробування (2006-2008) у зоні Степу – 23,9 ц/га, Лісостепу – 21,9 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,8-45,2%, білку – в межах 23,7-25,9%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – 0,7%.

Стійкість до вилягання – в межах 8,3-8,8; посухи – в межах 7,7-7,9; осипання – в межах 7,5-8,4 бала.

Стійкість до ураження пероноспорозом – в межах 8,2-9,0; бактеріозом – 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – в межах 8,4-8,8 бала.

Льон кудряш

07094001 Віра

Заявник: ДПДГ "Асканійське" Інституту олійних культур Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):