

середньою кількістю часток. Довжина черешка листка середня. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середньої довжини з довгим зубцем. Час цвітіння пізній.

Урожайність за роки випробування (2006-2008) у зоні Степу – 19,9 ц/га. Вміст жиру – 43,8%, білку – 25,8%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – 0,7%.

Стійкість до вилягання – 9,0; посухи – 7,7; осипання – 8,2 бала.

Стійкість до ураження пероноспорозом – 9,0; бактеріозом – 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – 7,8 бала.

### ® 06016008 Хузар

Заявник: Годовля рослин Стрельце Сполка з о.о.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля середньої ширини і довжини. Зубчастість краю листка помірна, листок середньої довжини і ширини з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка середня. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середньої довжини з довгим зубцем. Час цвітіння середній.

Урожайність за роки випробування (2006-2008) у зоні Степу – 22,1 ц/га. Вміст жиру – 44,2%, білку – 23,6%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – 0,7%.

Стійкість до вилягання – 9,0; посухи – 7,9; осипання – 8,6 бала.

Стійкість до ураження пероноспорозом – 9,0; бактеріозом – 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – 8,4 бала.

### ® 05016029 Хантер

Заявник: Рапс Г6Р насінневе господарство

Власник(и): Рапс Г6Р насінневе господарство

Підтримувач(і):

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля середньої ширини і довжини. Зубчастість краю листка помірна, листок середньої довжини і ширини з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка середня. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середньої довжини з середнім зубцем. Час цвітіння середній.

Урожайність за роки випробування (2006-2008) у зоні Степу – 23,9 ц/га, Лісостепу – 21,9 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,8-45,2%, білку – в межах 23,7-25,9%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – 0,7%.

Стійкість до вилягання – в межах 8,3-8,8; посухи – в межах 7,7-7,9; осипання – в межах 7,5-8,4 бала.

Стійкість до ураження пероноспорозом – в межах 8,2-9,0; бактеріозом – 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – в межах 8,4-8,8 бала.

## Льон кудряш

### 07094001 Віра

Заявник: ДПДГ "Асканійське" Інституту олійних культур Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина середньої висоти (враховуючи гілочки), розмір віночка квітки середній, колір пелюсток за повного цвітіння блідо-блакитний, поздовжній згин пелюстки відсутній, колір пиляка голубуватий, коробочка середнього розміру, маса 1000 насінин - середня, забарвлення насіння помірно-коричневе. Початок цвітіння ранній.

За даними заявника: Урожайність насіння 2,3 т/га, вегетаційний період 83 доби. Вихід олії 1,10 т/га. Стійкість до вилягання 4,7 бали, стійкість до осипання 5 балів.

## Сільськогосподарські: буряк

### Буряк цукровий

#### **06013007 Іріс**

Заявник: СесВандерхаве Н.Б./С.А.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток без антоціанового забарвлення. Тип розетки – розлога. Листок середньої довжини. Листкова пластинка середня за розміром, з помірною хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок білий, за шириною середній з білувато зеленим забарвленням в основі. Коренеплід великого розміру, довгий, вузькоконічної форми, заглиблений в ґрунт на 1/4.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2006-2008) середня врожайність коренеплодів у зоні Лісостепу становила 605,3 ц/га, Полісся – 583,8 ц/га. Цукристість відповідно – 16,4; 17,0 %. Збір цукру з гектара відповідно – 82,1; 82,7ц. Втрати цукру в мелясі відповідно – 2,1; 1,9%.

Гібрид стійкий до цвітущості та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу відповідно – 7,1; 6,5 бала. Придатність до механізованого збирання 6,3-7,9 бала.

#### **05013021 Альона КВС**

Заявник: КВС ЗААТ АГ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток з сильним антоціановим забарвленням. Тип розетки – розлога. Листок середньої довжини. Листкова пластинка середня за розміром, з помірною хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, за шириною середній з білувато зеленим забарвленням в основі. Коренеплід великого розміру, довгий, ширококонічної форми, заглиблений в ґрунт на 1/4.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2006-2008) середня врожайність коренеплодів у зоні Лісостепу становила 599,0 ц/га, Полісся – 596,5 ц/га. Цукристість відповідно – 16,4; 16,7%. Збір цукру з гектара відповідно – 81,6; 79,3 ц. Втрати цукру в мелясі відповідно – 2,0; 1,8%.

Гібрид стійкий до цвітущості та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу відповідно – 7,2; 5,0 бала. Придатність до механізованого збирання 6,4-8,2 бала.

#### **06013032 Балтіка**

Заявник: Даніско Сід ГмБХ

Власник(и):