

Листкова пластинка середня за розміром, з слабкою хвилястістю країв, слабо гофрована. Черешок білий, за шириною середній з білувато зеленим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру, середньої довжини, циліндрично-конічної форми, повністю заглиблений в ґрунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2006-2008) середня врожайність коренеплодів у зоні Лісостепу становила 582,1 ц/га. Цукристість –16,1 %. Збір цукру з гектара – 79,5 ц. Втрати цукру в мелясі – 1,8 %.

Гібрид стійкий до цвітущості та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу – 8,1 бала. Придатність до механізованого збирання – 8,1 бала.

05013030 ФД 0610

Заявник: САС Флоримонд Депре Вев е Фіс

Власник(и):

Підтримувач(и):

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток без антоціанового забарвлення. Тип розетки – напіврозлога. Листок середньої довжини. Листкова пластинка велика за розміром, з помірною хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, за шириною середній з білувато зеленим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру, довгий, ширококонічної форми, повністю заглиблений в ґрунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2006-2008) середня врожайність коренеплодів у зоні Лісостепу становила 557,8 ц/га. Цукристість – 16,7 %. Збір цукру з гектара – 76,3 ц. Втрати цукру в мелясі – 1,9 %.

Гібрид стійкий до цвітущості та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу – 7,8 бала. Придатність до механізованого збирання – 8,5 бала.

05013027 ФД 0607

Заявник: САС Флоримонд Депре Вев е Фіс

Власник(и):

Підтримувач(и):

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток без антоціанового забарвлення. Тип розетки – розлога. Листок короткий. Листкова пластинка середня за розміром, з помірною хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, за шириною середній з білувато зеленим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру, довгий, ширококонічної форми, заглиблений в ґрунт на 1/4.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2006-2008) середня врожайність коренеплодів у зоні Лісостепу становила 591,0 ц/га, Полісся – 610,3 ц/га. Цукристість відповідно –16,1; 16,6 %. Збір цукру з гектара відповідно –77,9; 88,1 ц. Втрати цукру в мелясі відповідно – 2,0; 1,8%.

Гібрид стійкий до цвітущості та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу відповідно – 7,4; 5,5 бала. Придатність до механізованого збирання 6,0-8,3 бала.

06013012 Хорол

Заявник: Інститут цукрових буряків Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(и):

Триплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток з помірним антоціановим забарвленням. Тип розетки – напівпохила. Листок середньої