

Власник(и):

Підтримувач(і):

Октаплоїд. Антоціанове забарвлення піхви листка середнє. Рослина прямостояча, середня з вузькою шириною та середньою довжиною, розміром, формою прапорцевого листка та зеленим забарвленням листка. Стебло довге за довжиною найдовшого стебла та середнє за довжиною верхнього міжвузля. Суцвіття середнє, помірне з сильним антоціановим забарвленням пльовок. Рослина з помірним часом та динамікою колосіння, а також з середньою схильністю до колосіння після скошування.

Урожайність, ц/га сухої речовини: С - 48,9; Л - 35,5; П - 59,4; Днів до дозрівання: С - 73,6; Л - 663; П - 79,5. Висота рослини, см: С - 58,2; Л - 89,9; П - 114,5. Залистяність, %: С - 65,4; Л - 53,3; П - 43,0. Стійкість, бал до: посухи С - 7,0; Л - 7,0; П - 8,0; вилягання С - 9,0; Л - 9,0; П - 9,0; іржі С - 9,0; Л - 9,0; П - 9,0; борошністої роси С - 9,0; Л - 9,0; П - 9,0. Вміст клітковини, %: С - 29,5; Л - 31,4; П - 30,6. Вміст білка, %: С - 9,8; Л - 8,2; П - 9,7. Напрямок використання - сінокісно-пасовищний.

### Тимофіївка лучна

#### 05068003 Пірнівчанка

Заявник: Київська дослідна станція Національного наукового центру "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гексаплоїд. Швидкість викидання суцвіть у рік сівби - дуже повільна. Листок на другому році життя до фази виходу в трубку - зелений та середній по ширині. Куц напівпрямий, час викидання суцвіття - середній. Прапорцевий листок середній, стебло середнє за довжиною найдовшого стебла та довге за довжиною верхнього міжвузля, суцвіття довге.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ: Грунтово - кліматичні зони: Полісся

Урожайність, ц/га сухої речовини: 82,8

Днів до дозрівання: 75,5

Висота рослин, см: 83,0

Залистяність, %: 46,0

Стійкість, бал до: - посухи 7,0

- вилягання 9,0

- іржі 9,0

- борошністої роси 9,0

Вміст клітковини, %: 33,8

Вміст білка, %: 8,0

Група стиглості - середньостигла

Напрямок використання - сінокісно пасовищний

#### 05068002 Пасічнянська

Заявник: Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїд. Швидкість викидання суцвіть у рік сівби - дуже повільна. Листок на другому році життя до фази виходу в трубку - зелений та середній по ширині. Куц напівпрямий, час викидання суцвіття - середній. Прапорцевий листок, стебло та суцвіття – середні.

Урожайність, ц/га сухої речовини: -	47,3
Днів до дозрівання	74,8
Залистяність, %	47,8
Висота рослин, см	97,5
Стійкість, бал до: - посухи	7,0
- вилягання	9,0
- іржі	9,0
- борошністої роси	9,0
Вміст білка, %	9,0
Вміст клітковини, %	28,5
Напрямок використання - сінокісний, лукопасовищний	

### Пажитниця багатоквіткова

#### 05061002 Коломийська

Заявник: Коломийська дослідна станція Івано-Франківського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїд. Рослина з напівпрямостоячим типом куца восени, середньою тенденцією до утворення суцвіть на перший рік висіву та середнім часом викидання суцвіття в рік висіву. Листок світло-зелений. Рослина з проміжним типом куца навесні проміжний. Час викидання волоті на другому році життя середній. Прапорцевий листок та стебло середні, суцвіття довге з великою кількістю колосків.

Урожайність, ц/га сухої речовини: 49,8. Днів до дозрівання: 80,0. Залистяність, %: 44,8. Стійкість, б, до: посухи - 8,0, вилягання - 9,0. Ураження хворобами, %: стебловою іржею - 9,0; борошністою росю - 9,0. Вміст, %: білку - 7,4; клітковини - 33,2. Напрямок використання: сінокісно-пасовищний. Рекомендована зона вирощування- Полісся.

#### 05061001 Лагідна

Заявник: Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тетраплоїд. Рослина напівпрямостояча, середня з відсутньою або дуже слабкою тенденцією до утворення суцвіть на перший рік висіву з дуже раннім часом викидання суцвіття в рік висіву, тип куца навесні проміжний. Листок зелений, прапорцевий листок та стебло середнє, суцвіття довге з великою кількістю колосків.

Урожайність, ц/га сухої речовини, середня: 48,9. Днів до дозрівання : 79,8. Залистяність, %: 42,9. Стійкість, б, до: посухи - 8,0, вилягання - 9,0. Ураження хворобами, %:стебловою іржею - 9,0, борошністою росю - 9,0. Вміст, %: білку - 8,6, клітковини - 31,1. Напрямок використання: сінокісно-пасовищний. Рекомендована зона вирощування-Полісся.

### Люпин білий