

Диплоїд. Швидкість викидання суцвіть у рік сівби - дуже повільна. Листок на другому році життя до фази виходу в трубку - зелений та середній по ширині. Куц напівпрямий, час викидання суцвіття - середній. Прапорцевий листок, стебло та суцвіття – середні.

Урожайність, ц/га сухої речовини: -	47,3
Днів до дозрівання	74,8
Залистяність, %	47,8
Висота рослин, см	97,5
Стійкість, бал до: - посухи	7,0
- вилягання	9,0
- іржі	9,0
- борошнистої роси	9,0
Вміст білка, %	9,0
Вміст клітковини, %	28,5
Напрямок використання - сінокісний, лукопасовищний	

Пажитниця багатоквіткова

05061002 Коломийська

Заявник: Коломийська дослідна станція Івано-Франківського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїд. Рослина з напівпрямостоячим типом куца восени, середньою тенденцією до утворення суцвіть на перший рік висіву та середнім часом викидання суцвіття в рік висіву. Листок світло-зелений. Рослина з проміжним типом куца навесні проміжний. Час викидання волоті на другому році життя середній. Прапорцевий листок та стебло середні, суцвіття довге з великою кількістю колосків.

Урожайність, ц/га сухої речовини: 49,8. Днів до дозрівання: 80,0. Залистяність, %: 44,8. Стійкість, б, до: посухи - 8,0, вилягання - 9,0. Ураження хворобами, %: стебловою іржею - 9,0; борошнистою росю - 9,0. Вміст, %: білку - 7,4; клітковини - 33,2. Напрямок використання: сінокісно-пасовищний. Рекомендована зона вирощування- Полісся.

05061001 Лагідна

Заявник: Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тетраплоїд. Рослина напівпрямостояча, середня з відсутньою або дуже слабкою тенденцією до утворення суцвіть на перший рік висіву з дуже раннім часом викидання суцвіття в рік висіву, тип куца навесні проміжний. Листок зелений, прапорцевий листок та стебло середнє, суцвіття довге з великою кількістю колосків.

Урожайність, ц/га сухої речовини, середня: 48,9. Днів до дозрівання : 79,8. Залистяність, %: 42,9. Стійкість, б, до: посухи - 8,0, вилягання - 9,0. Ураження хворобами, %:стебловою іржею - 9,0, борошнистою росю - 9,0. Вміст, %: білку - 8,6, клітковини - 31,1. Напрямок використання: сінокісно-пасовищний. Рекомендована зона вирощування-Полісся.

Люпин білий