

® 05055002 Щедрий 50

Заявник: Чернігівський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гірка речовина у зерні відсутня. Рослина пряма, з індетермінантним типом росту. Рослина через три тижні після появи сходів та у фазі початку цвітіння низька, а у фазі зеленої стиглості висока. Листок в стадії бутонізації зелений, верхівковий листочок короткий, вузький. Квітка синювато-біла з синьо-чорним забарвленням кінчика човника. Біб середній, зерно біле без орнаментациї. Рослина з середнім часом початку цвітіння, зеленої та повної стиглості.

Середня урожайність: сухої речовини - Полісся - 69,9ц/га (гарантована прибавка - 1,3 ц/га або1,8%); насіння – Полісся 22,5 ц/га. Вміст сирого протеїну – 21,5%. Вегетаційний період-84,6днів. Маса 1000 зерен -290-350г.Сорт достатньо посухостійкий, незначно уражується хворобами. Залистяність - 59,8 % . Вміст алкалоїдів у зерні - 0,023. Напрямок використання - кормовий.

Люпин жовтий

® 05057002 Прогресивний

Заявник: Чернігівський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гірка речовина у зерні відсутня. Рослина пряма, з індетермінантним типом росту Рослина через три тижні після появи сходів та у фазі початку цвітіння низька, а у фазі зеленої стиглості висока. Листок в стадії бутонізації зелений, верхівковий листочок короткий, вузький. Квітка хромово-жовта з синьо-чорним забарвленням кінчика човника. Біб середній, зерно сіре з орнаментациєю. Рослина з середнім часом початку цвітіння, зеленої та повної стиглості.

Середня урожайність: сухої речовини - Полісся - 54,2ц/га (гарантована прибавка - 0,4ц/га або0,7%); насіння – Полісся 17,0ц/га. Вміст сирого протеїну – 21,3%. Вегетаційний період-76,2днів. Маса 1000 зерен -112-117г.Сорт достатньо посухостійкий, незначно уражується хворобами. Залистяність - 60,3% . Вміст алкалоїдів у зерні - 0,019. Напрямок використання - кормовий.

Козлятник східний

08321001 НБС-75

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина пряма, Рослина у перший рік життя досягає фази цвітіння, середня за висотою та кількістю бічних пагонів I порядку, пагони II порядку не утворює. Рослина з наявним антоціановим забарвленням стебел, сильною кущистістю та середньою кількістю міжвузлів, опушеність відсутня. Листок непарнопірчастий, широкий, довгий з темною інтенсивністю листочків. Листок з довгим рахісом, суцвіття головної осі середня за довжиною складна китиця з потрійною кількістю китиць. Квітка світло-синя, рослина з великою кількістю бобів середніх за довжиною на головній осі. Насінина ниркоподібна із зазубленням біля рубчика, світло-жовта та середньою масою 100 насінин.

Рослина з вегетаційним періодом 80-85 діб, висота рослини - 160-165 см, містить 25-26% білку, 26-27% клітковини, маса 1000 насінин - 7,6-8,0 г,