

® 05055002 Щедрий 50

Заявник: Чернігівський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гірка речовина у зерні відсутня. Рослина пряма, з індетермінантним типом росту. Рослина через три тижні після появи сходів та у фазі початку цвітіння низька, а у фазі зеленої стиглості висока. Листок в стадії бутонізації зелений, верхівковий листочок короткий, вузький. Квітка синювато-біла з синьо-чорним забарвленням кінчика човника. Біб середній, зерно біле без орнаментациї. Рослина з середнім часом початку цвітіння, зеленої та повної стиглості.

Середня урожайність: сухої речовини - Полісся - 69,9ц/га (гарантована прибавка - 1,3 ц/га або1,8%); насіння – Полісся 22,5 ц/га. Вміст сирого протеїну – 21,5%. Вегетаційний період-84,6днів. Маса 1000 зерен -290-350г.Сорт достатньо посухостійкий, незначно уражується хворобами. Залистяність - 59,8 % . Вміст алкалоїдів у зерні - 0,023. Напрямок використання - кормовий.

Люпин жовтий

® 05057002 Прогресивний

Заявник: Чернігівський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гірка речовина у зерні відсутня. Рослина пряма, з індетермінантним типом росту Рослина через три тижні після появи сходів та у фазі початку цвітіння низька, а у фазі зеленої стиглості висока. Листок в стадії бутонізації зелений, верхівковий листочок короткий, вузький. Квітка хромово-жовта з синьо-чорним забарвленням кінчика човника. Біб середній, зерно сіре з орнаментациєю. Рослина з середнім часом початку цвітіння, зеленої та повної стиглості.

Середня урожайність: сухої речовини - Полісся - 54,2ц/га (гарантована прибавка - 0,4ц/га або0,7%); насіння – Полісся 17,0ц/га. Вміст сирого протеїну – 21,3%. Вегетаційний період-76,2днів. Маса 1000 зерен -112-117г.Сорт достатньо посухостійкий, незначно уражується хворобами. Залистяність - 60,3% . Вміст алкалоїдів у зерні - 0,019. Напрямок використання - кормовий.

Козлятник східний

08321001 НБС-75

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина пряма, Рослина у перший рік життя досягає фази цвітіння, середня за висотою та кількістю бічних пагонів I порядку, пагони II порядку не утворює. Рослина з наявним антоціановим забарвленням стебел, сильною кущистістю та середньою кількістю міжвузлів, опушеність відсутня. Листок непарнопірчастий, широкий, довгий з темною інтенсивністю листочків. Листок з довгим рахісом, суцвіття головної осі середня за довжиною складна китиця з потрійною кількістю китиць. Квітка світло-синя, рослина з великою кількістю бобів середніх за довжиною на головній осі. Насінина ниркоподібна із зазубленням біля рубчика, світло-жовта та середньою масою 100 насінин.

Рослина з вегетаційним періодом 80-85 діб, висота рослини - 160-165 см, містить 25-26% білку, 26-27% клітковини, маса 1000 насінин - 7,6-8,0 г,

258
збір сухої речовини в середньому за рік використання становить 15,9 т/га, урожайність насіння -0,7-0,8 т/га. Рослина характеризується високим балом стійкості до посухи, вилягання, обсіпання, зимостійкості.

Щириця

08099001 Студентський

Заявник: Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток з слабкою інтенсивністю антоціанового забарвлення гіпокотилію. Рослина прямостояча з індетермінантним типом росту. Листок з зубчастим краєм, яйцевидний, середній з помірною інтенсивністю антоціанового забарвлення черешка. Листок з сильною виразністю жилок (у стадії 6-8 листків), світло-зелений. Рослина з середнім часом початку цвітіння. Стебло зелене, форма у поперечному перерізі хвиляста. Суцвіття пряме, довге, рожеве, щільне, волотеве з середньою кількістю жіночих квіток на одну кульку, час початку цвітіння середній. Корінь під час цвітіння білий, насіння прозоре, дископодібне, матове. Рослина з малим відсотком осипання насіння від загальної кількості.

Середня урожайність: насіння – 27,7 ц/га. Вміст сирого протеїну – 18,6%. Вегетаційний період-125днів. Сорт достатньо посухостійкий, незначно уражується хворобами. Висота рослини-125см. Довжина волоті-12,6. Маса 1000 насінин-0,83г. Напрямок використання - зерно. Рекомендована зона вирощування Лісостеп.

Сильфій пронизанолистий

08134002 Богатир

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядольних листків темна. Рослина висока в перший рік життя, пряма з середньою інтенсивністю пагоноутворення. Стебло без опушення, товсте, з середньою кількістю міжвузлів та слабкою інтенсивністю антоціанового забарвлення. Листок з помірною інтенсивністю зеленого забарвлення, ромбовидний, широкий, довгий, з пилчастою формою краю листової пластинки, розташування листків мутовчасте, середній за довжиною черешка, не цупкий. Рослина не утворює суцвіття у перший рік життя з середньою інтенсивністю утворення генеративних пагонів, час початку цвітіння пізній, суцвіття розгалужене (пухке). Кошик з жовтим віночком, великий з широкою язичковою квіткою. Рослина з довгою тривалістю вегетаційного періоду (до повного досягання насіння). Насіння коричневе.

Рослина з вегетаційним періодом 155-160 діб, висота рослини - 280-300 см, містить 15-16% білку, 22-25% клітковини, маса 1000 насінин - 24,0 г, збір сухої речовини в середньому за рік використання становить 140-150 (33,6-37,5)т/га, урожайність насіння -0,4-0,5 т/га. Рослина характеризується високим балом стійкості до посухи, вилягання, обсіпання, зимостійкості.

Тіфон

08282001 Фітопал

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

Власник(и):

Підтримувач(і):