

258
збір сухої речовини в середньому за рік використання становить 15,9 т/га, урожайність насіння -0,7-0,8 т/га. Рослина характеризується високим балом стійкості до посухи, вилягання, обсіпання, зимостійкості.

Щириця

08099001 Студентський

Заявник: Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток з слабкою інтенсивністю антоціанового забарвлення гіпокотилію. Рослина прямостояча з індетермінантним типом росту. Листок з зубчастим краєм, яйцевидний, середній з помірною інтенсивністю антоціанового забарвлення черешка. Листок з сильною виразністю жилок (у стадії 6-8 листків), світло-зелений. Рослина з середнім часом початку цвітіння. Стебло зелене, форма у поперечному перерізі хвиляста. Суцвіття пряме, довге, рожеве, щільне, волотеве з середньою кількістю жіночих квіток на одну кульку, час початку цвітіння середній. Корінь під час цвітіння білий, насіння прозоре, дископодібне, матове. Рослина з малим відсотком осипання насіння від загальної кількості.

Середня урожайність: насіння – 27,7 ц/га. Вміст сирого протеїну – 18,6%. Vegetaційний період-125днів. Сорт достатньо посухостійкий, незначно уражується хворобами. Висота рослини-125см. Довжина волоті-12,6. Маса 1000 насінин-0,83г. Напрямок використання - зерно. Рекомендована зона вирощування Лісостеп.

Сильфій пронизанолистий

08134002 Богатир

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядольних листків темна. Рослина висока в перший рік життя, пряма з середньою інтенсивністю пагоноутворення. Стебло без опушення, товсте, з середньою кількістю міжвузлів та слабкою інтенсивністю антоціанового забарвлення. Листок з помірною інтенсивністю зеленого забарвлення, ромбовидний, широкий, довгий, з пилчастою формою краю листової пластинки, розташування листків мутовчасте, середній за довжиною черешка, не цупкий. Рослина не утворює суцвіття у перший рік життя з середньою інтенсивністю утворення генеративних пагонів, час початку цвітіння пізній, суцвіття розгалужене (пухке). Кошик з жовтим віночком, великий з широкою язичковою квіткою. Рослина з довгою тривалістю вегетаційного періоду (до повного досягання насіння). Насіння коричневе.

Рослина з вегетаційним періодом 155-160 діб, висота рослини - 280-300 см, містить 15-16% білку, 22-25% клітковини, маса 1000 насінин - 24,0 г, збір сухої речовини в середньому за рік використання становить 140-150 (33,6-37,5)т/га, урожайність насіння -0,4-0,5 т/га. Рослина характеризується високим балом стійкості до посухи, вилягання, обсіпання, зимостійкості.

Тіфон

08282001 Фітопал

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

Власник(и):

Підтримувач(і):