

258  
збір сухої речовини в середньому за рік використання становить 15,9 т/га, урожайність насіння -0,7-0,8 т/га. Рослина характеризується високим балом стійкості до посухи, вилягання, обсіпання, зимостійкості.

### Щириця

#### 08099001 Студентський

Заявник: Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток з слабкою інтенсивністю антоціанового забарвлення гіпокотилію. Рослина прямостояча з індетермінантним типом росту. Листок з зубчастим краєм, яйцевидний, середній з помірною інтенсивністю антоціанового забарвлення черешка. Листок з сильною виразністю жилок (у стадії 6-8 листків), світло-зелений. Рослина з середнім часом початку цвітіння. Стебло зелене, форма у поперечному перерізі хвиляста. Суцвіття пряме, довге, рожеве, щільне, волотеве з середньою кількістю жіночих квіток на одну кульку, час початку цвітіння середній. Корінь під час цвітіння білий, насіння прозоре, дископодібне, матове. Рослина з малим відсотком осипання насіння від загальної кількості.

Середня урожайність: насіння – 27,7 ц/га. Вміст сирого протеїну – 18,6%. Vegetaційний період-125днів. Сорт достатньо посухостійкий, незначно уражується хворобами. Висота рослини-125см. Довжина волоті-12,6. Маса 1000 насінин-0,83г.Напряв використання - зерно. Рекомендована зона вирощування Лісостеп.

### Сильфій пронизанолистий

#### 08134002 Богатир

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядольних листків темна. Рослина висока в перший рік життя, пряма з середньою інтенсивністю пагоноутворення. Стебло без опушення, товсте, з середньою кількістю міжвузлів та слабкою інтенсивністю антоціанового забарвлення. Листок з помірною інтенсивністю зеленого забарвлення, ромбовидний, широкий, довгий, з пилчастою формою краю листової пластинки, розташування листків мутовчасте, середній за довжиною черешка, не цупкий. Рослина не утворює суцвіття у перший рік життя з середньою інтенсивністю утворення генеративних пагонів, час початку цвітіння пізній, суцвіття розгалужене (пухке). Кошик з жовтим віночком, великий з широкою язичковою квіткою. Рослина з довгою тривалістю вегетаційного періоду (до повного досягання насіння).Насіння коричневе.

Рослина з вегетаційним періодом 155-160 діб, висота рослини - 280-300 см, містить 15-16% білку, 22-25% клітковини, маса 1000 насінин - 24,0 г, збір сухої речовини в середньому за рік використання становить 140-150 (33,6-37,5)т/га, урожайність насіння -0,4-0,5 т/га. Рослина характеризується високим балом стійкості до посухи, вилягання, обсіпання, зимостійкості.

### Тіфон

#### 08282001 Фітопал

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

Власник(и):

Підтримувач(і):

Сім'ядольні листки з помірною інтенсивністю зеленого забарвлення. Рослина напіврозлога, висока. Стебло велике, листок еліптичний, великий, широкий з помірною інтенсивністю зеленого забарвлення пластинки, на рослині листків багато. Листок стеблообгортний з ступіню охоплення стебла більше половини. Листок з помірною зубчастістю краю, без опушення. Рослина з пізнім початком цвітіння з великою кількістю суцвіть та бічних пагонів I-II порядку. Квітка з золотисто-жовтими пелюстками, велика. Стручок довгий, насінина з помірною інтенсивністю коричневого забарвлення.

Рослина з вегетаційним періодом 300-320 діб, висота рослини - 130-145 см, містить 40-45% олії, 26-27% , маса 1000 насінин - 4,2-4,7 г, збір сухої речовини в середньому за рік використання становить 42-50 (5,2-6,0)т/га, урожайність насіння -4,0 т/га. Рослина характеризується високим балом стійкості до посухи, вилягання, обсіпання, зимостійкості.

## Фацелія

### 07199001 Бало

Заявник: Фельдзаатен Фройденбергер ГмБХ унд Ко.КГ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Маса 1000 насінин велика (2,0 - 2,5 г), насіння коричневе. Рослина середня, стебло з помірним галушенням. Листок з наявним антоціановим забарвленням, середній. Рослина з середньою кількістю суцвіть (4-5) та середньою кількістю (3-4) квіток на одному квітконосі, середньою кількістю квіток (5-8) на квітконосі головного пагона. Квітка блакитно-фіолетова, початок цвітіння ранній.

Медоносно-кормова культура. Урожайність сухої речовини - 36,6 у/га. Урожайність насіння 4 ц/га. Маса 1000 насінин - 2,5г. Висота рослини - 71,5см. Залистяність становить - 62%. Днів до досягання - 58. Зона вирощування - Лісостеп..

## Костриця червона мінлива

### 08186001 Лівіста

Заявник: Євро Грас Брідінг ГмБХ і Ко. КГ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гексаплоїд. Піхва листка з слабким антоціановим забарвленням (влітку в рік висіву), листкова пластинка скручена, кореневище наявне. Рослина з проміжним типом куща. Листок зелений, середній без нальоту. Рослина з раннім часом викидання суцвіття. Прапорцевий листок та стебло середні. Квітуче суцвіття середні без остюків.

Урожай насіння, ц/га	7.0
Зимостійкість, бал	7.0
Посухостійкість, бал	7.0
Початок сходів після посіву, днів	10
Загальна декоративність, бал: - весною	9.0
- літом	7.0
- восени	6.0
Проектне покриття, бал: - до скошування	7.0
- після скошування	7.0
Стійкість до хвороб, бал:	