

Сім'ядольні листки з помірною інтенсивністю зеленого забарвлення. Рослина напіврозлога, висока. Стебло велике, листок еліптичний, великий, широкий з помірною інтенсивністю зеленого забарвлення пластинки, на рослині листків багато. Листок стеблообгортний з ступіню охоплення стебла більше половини. Листок з помірною зубчастістю краю, без опушення. Рослина з пізнім початком цвітіння з великою кількістю суцвіть та бічних пагонів I-II порядку. Квітка з золотисто-жовтими пелюстками, велика. Стручок довгий, насінина з помірною інтенсивністю коричневого забарвлення.

Рослина з вегетаційним періодом 300-320 діб, висота рослини - 130-145 см, містить 40-45% олії, 26-27% , маса 1000 насінин - 4,2-4,7 г, збір сухої речовини в середньому за рік використання становить 42-50 (5,2-6,0)т/га, урожайність насіння -4,0 т/га. Рослина характеризується високим балом стійкості до посухи, вилягання, обсипання, зимостійкості.

Фацелія

07199001 Бало

Заявник: Фельдзаатен Фройденбергер ГмБХ унд Ко.КГ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Маса 1000 насінин велика (2,0 - 2,5 г), насіння коричневе. Рослина середня, стебло з помірним галузненням. Листок з наявним антоціановим забарвленням, середній. Рослина з середньою кількістю суцвіть (4-5) та середньою кількістю (3-4) квіток на одному квітконосі, середньою кількістю квіток (5-8) на квітконосі головного пагона. Квітка блакитно-фіолетова, початок цвітіння ранній.

Медоносно-кормова культура. Урожайність сухої речовини - 36,6 у/га. Урожайність насіння 4 ц/га. Маса 1000 насінин - 2,5г. Висота рослини - 71,5см. Залистяність становить - 62%. Днів до досягання - 58. Зона вирощування - Лісостеп..

Костриця червона мінлива

08186001 Лівіста

Заявник: Євро Грас Брідінг ГмБХ і Ко. КГ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гексаплоїд. Піхва листка з слабким антоціановим забарвленням (влітку в рік висіву), листкова пластинка скручена, кореневище наявне. Рослина з проміжним типом куща. Листок зелений, середній без нальоту. Рослина з раннім часом викидання суцвіття. Прапорцевий листок та стебло середні. Квітуче суцвіття середні без остюків.

Урожай насіння, ц/га	7.0
Зимостійкість, бал	7.0
Посухостійкість, бал	7.0
Початок сходів після посіву, днів	10
Загальна декоративність, бал: - весною	9.0
- літом	7.0
- восени	6.0
Проектне покриття, бал: - до скошування	7.0
- після скошування	7.0
Стійкість до хвороб, бал:	

-бурої іржі	8.0
-борошністої роси	8.0
-стеблової іржі	7.0

Група стиглості - ранньостиглий
Напрямок використання - озеленення

Костриця червона

08111003 Джевелін

Заявник: Євро Грас Брідінг ГмБХ і Ко. КГ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гексаплоїд. Піхва листка з помірним антоціановим забарвленням (влітку в рік висіву), листкова пластинка скручена, кореневище наявне. Рослина з проміжним типом куща. Листок зелений, широкий без нальоту. Рослина з пізнім часом викидання суцвіття. Прапорцевий листок та стебло середні. Квітуче суцвіття середнє без остюків.

Урожай насіння, ц/га	8.0
Зимостійкість, бал	7.0
Посухостійкість, бал	7.0
Початок сходів після посіву, днів	7.0
Загальна декоративність, бал: - весною	8.0
- літом	8.0
- восени	6.0

Проектне покриття, бал: - до скошування 6.0
- після скошування 6.0

Стойкість до хвороб, бал:

-бурої іржі	8.0
-борошністої роси	8.0
-бурої п'ятнистості	8.0

Група стиглості - пізньостиглий
Напрямок використання - озеленення

08111004 Лайт

Заявник: Євро Грас Брідінг ГмБХ і Ко. КГ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Октоплоїд. Піхва листка з помірним антоціановим забарвленням (влітку в рік висіву), листкова пластинка скручена, кореневище наявне. Рослина з проміжним типом куща. Листок зелений, середній без нальоту. Рослина з раннім часом викидання суцвіття. Прапорцевий листок та стебло довгі. Квітуче суцвіття довге без остюків.

Середня урожайність сухої речовини - 76,5 ц/га. Вміст сирого протеїну – 9,7%. Вміст клітковини - 29,8%. Сорт ранньостиглий, має високі показники посухостійкості, зимостійкості та стійкості до хвороб. Років використання - 5. Висота рослини - 55см. Напрямок використання -