

- після скошування 7.0
 Стійкість до хвороб, бал:

- бурої іржі 6.0
 - борошністої роси 8.0
 - бурої п'ятнистості 6.0

Група стиглості - середньостиглий
 Напрямок використання - озеленення

Тонконіг лучний

08069001 Лінкольншір

Заявник: Євро Грас Брідінг ГмбХ і Ко. КГ

Власник(и):

Підтримувач(и):

В пазухах листка відсутнє або дуже слабе антоціанове забарвлення, щільність волосків по краю пазух листка та щільність волосків з обох боків безпосередньо під листковою пластинкою помірна. Пазуха листка за довжиною волосків язичка коротка. Листкова пластинка з помірною щільністю торчкових волосків на краю основи. Рослина напівсланка. Листок зелений, вузький з помірним пожовтінням в кінці зимового сезону. Час викидання суцвіття середній, прапорцевий листок середній, стебло дуже коротке, середнє. Суцвіття з помірним антоціановим забарвленням, дуже коротке, форма шийки осі навпроти прикріплення нижніх гілочок відкрита, положення нижніх бічних гілочок горизонтальне.

Урожай насіння, ц/га 6.0
 Зимостійкість, бал 8.0
 Посухостійкість, бал 6.0
 Початок сходів після посіву, днів 18
 Загальна декоративність, бал: - весною 8.0
 - літом 8.0
 - восени 7.0

Проектне покриття, бал: - до скошування 8.0
 - після скошування 8.0

Стійкість до хвороб, бал:

- бурої іржі 7.0
 - борошністої роси 7.0
 - стеблової іржі 8.0

Група стиглості - середньостиглий
 Напрямок використання - озеленення

08069003 Лімаги

Заявник: Євро Грас Брідінг ГмбХ і Ко. КГ

Власник(и):

Підтримувач(и):

Пазуха листка з сильним антоціановим забарвленням та щільність волосків по краю рясна. Рослина: тип куща (восени в рік висіву) напівпрямостоячий. Листок зелений, середній. Час викидання суцвіття середній, прапорцевий листок середній. Стебло довге, середнє, суцвіття з слабким антоціановим забарвленням, суцвіття пряме, відкрите, напівзвисаюче, дуже довге.

Середня урожайність сухої речовини - 90ц/га. Вміст сирого протеїну – 9,0%. Вміст клітковини - 27,7%. Сорт середньостиглий, має непогані показники посухостійкості, зимостійкості та стійкості до хвороб. Висота рослини - 35см. Років використання - 5р. Маса 100 насінин - 2,3г. Напрям використання - кормовий.

08069002 Парсіфал

Заявник: Євро Грас Брідінг ГмбХ і Ко. КГ

Власник(и):

Підтримувач(и):

Пазуха листка з відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням та щільність волосків по краю обрідна. Рослина: тип куща (восени в рік висіву) проміжний. Листок темно-зелений, вузький. Час викидання суцвіття ранній, прапорцевий листок середній. Стебло середнє, коротке, суцвіття з сильним антоціановим забарвленням, суцвіття пряме, відкрите. Горизонтальне, коротке.

Урожай насіння, ц/га	6.0
Зимостійкість, бал	7.0
Посухостійкість, бал	7.0
Початок сходів після посіву, днів	16
Загальна декоративність, бал: - весною	8.0
- літом	8.0
- восени	7.0

Проектне покриття, бал: - до скошування 7.0
- після скошування 7.0

Стійкість до хвороб, бал:

-бурої іржі	7.0
-борошнистої роси	7.0
-бурої п'ятнистості	6.0

Група стиглості - пізньостиглий

Напрям використання - озеленення

Пирій середній

07423001 Хорс

Заявник: Інститут кормів Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(и):

Кущ у фаза повного колосіння розкидистий та розлогий восени. Рослина з дуже слабкою тенденцією до утворення суцвіть у перший рік сівби. Листок з помірною інтенсивністю зеленого забарвлення з наявним нальотом восени у рік висіву. Рослина середня за висотою навесні та висока під час викидання колоса. Час викидання колосу на другому році життя – середній. Прапорцевий листок дуже довгий та середній по ширині. Стебло довге. Колосок довгий із середньою кількістю колосків.