

Пазуха листка з сильним антоціановим забарвленням та щільність волосків по краю рясна. Рослина: тип куща (восени в рік висіву) напівпрямостоячий. Листок зелений, середній. Час викидання суцвіття середній, прапорцевий листок середній. Стебло довге, середнє, суцвіття з слабким антоціановим забарвленням, суцвіття пряме, відкрите, напівзвисаюче, дуже довге.

Середня урожайність сухої речовини - 90ц/га. Вміст сирого протеїну – 9,0%. Вміст клітковини - 27,7%. Сорт середньостиглий, має непогані показники посухостійкості, зимостійкості та стійкості до хвороб. Висота рослини - 35см. Років використання - 5р. Маса 100 насінин - 2,3г. Напряма використання - кормовий.

08069002 Парсіфал

Заявник: Євро Грас Брідінг ГмбХ і Ко. КГ

Власник(и):

Підтримувач(и):

Пазуха листка з відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням та щільність волосків по краю обрідна. Рослина: тип куща (восени в рік висіву) проміжний. Листок темно-зелений, вузький. Час викидання суцвіття ранній, прапорцевий листок середній. Стебло середнє, коротке, суцвіття з сильним антоціановим забарвленням, суцвіття пряме, відкрите. Горизонтальне, коротке.

Урожай насіння, ц/га	6.0
Зимостійкість, бал	7.0
Посухостійкість, бал	7.0
Початок сходів після посіву, днів	16
Загальна декоративність, бал: - весною	8.0
- літом	8.0
- восени	7.0

Проектне покриття, бал: - до скошування 7.0
- після скошування 7.0

Стійкість до хвороб, бал:

-бурої іржі	7.0
-борошнистої роси	7.0
-бурої п'ятнистості	6.0

Група стиглості - пізньостиглий

Напряма використання - озеленення

Пирій середній

07423001 Хорс

Заявник: Інститут кормів Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(и):

Куш у фаза повного колосіння розкидистий та розлогий восени. Рослина з дуже слабкою тенденцією до утворення суцвіть у перший рік сівби. Листок з помірною інтенсивністю зеленого забарвлення з наявним нальотом восени у рік висіву. Рослина середня за висотою навесні та висока під час викидання колоса. Час викидання колосу на другому році життя – середній. Прапорцевий листок дуже довгий та середній по ширині. Стебло довге. Колосок довгий із середньою кількістю колосків.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ :

Урожайність, ц/га сухої речовини: -	Л -138,5	С-102,25
Вегетаційний період, дн	75	70
Висота рослин, см	158	123
Стійкість, бал до: - посухи	9,0	9,0
- вилягання	7,0	7,0
- іржі	4,0	4,0
- аскохітозу	9,0	9,0
- антрактозу	9,0	9,0
Вміст білка, %	12,8	12,0
Вміст клітковини, %	25,6	26,9
Років використання	7	7
Напрямок використання - сінокісно-пасовищний		

Щавнат**08424001 Наставник**

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина з середньою висотою розетки та довжиною генеративного пагону, напіврозлога та з сильною інтенсивністю пагоноутворення і помірною інтенсивністю зеленого забарвлення листків. Стебло сильне, циліндричне з середньою кількістю міжвузль і інтенсивністю антоціанового забарвлення. Листок розетковий, середній, з слабо хвилястим краєм листової пластинки. Волоть червонувато – бура, дуже галузиста (ботричне), середня. Насіння дуже дружно досягає, рослина характеризується сильною інтенсивністю відростання після збирання на зелень. Рослина з раннім часом викидання суцвіття та цвітіння та короткою тривалістю вегетаційного періоду до споживчої стиглості та повного досягання насіння та слабкою інтенсивністю відростання після збирання насіння.

Рослина з вегетаційним періодом 90-100 діб, висота рослини - 185-195 см, містить 20-23% білку, 31-34% клітковини, маса 1000 насінин - 2,5-2,7г, збір сухої речовини в середньому за рік використання становить 90-110 (16,2-22,0) т/га, урожайність насіння -1,5-1,6 т/га. Рослина характеризується високим балом стійкості до посухи, вилягання, обсіпання, зимостійкості.

Кострице-райграсовий гібрид**08410001 Ліфема**

Заявник: Євро Грас Брідінг ГмБХ і Ко. КГ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тетраплоїд. Рослина проміжна, напівстояча, висока з малою схильністю до колосіння. Листок зелений, прапорцевий листок довгий, похилий, широкий, середнього розміру з волосками на верхньому боці пластинки та з зубчастим краєм пластинки. Суцвіття як у костриці, довге, помірне. Рослина з раннім часом колосіння, помірною динамікою колосіння помірне та середньою часткою генеративних пагонів і схильністю