

до відростання.

Середня урожайність сухої речовини - 121ц/га. Вміст сирого протеїну – 11,3%. Вміст клітковини - 27,5%. Сорт середньостиглий, має непогані показники посухостійкості, зимостійкості та стійкості до хвороб. Висота рослини - 70см. Років використання - 4р. Маса 100 насінин - 4,5. г.Напрямок використання - кормовий.

Стоколос прибережний

07479001 Боян

Заявник: Інститут кормів Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Антоціанове забарвлення справжнього листка дуже слабе. Природна висота рослини – середня, листкова піхва з легким ступенем опушення, листок зелений, прапорцевий листок середній за довжиною, шириною та розміром. Стебло середнє, час початку колосіння – ранній, динаміка колосіння – помірна, тенденція до колосіння після скошування – дуже мала. Суцвіття середнє, нещільне, з дуже слабким антоціановим забарвленням півок.

Урожайність, ц/га сухої речовини: Л- 134,75; С-99,25. Вегетаційний період Л-59 дн, С-50дн. Висота рослини, см: Л-105, С-110. Залистяність, %: Л-48,0, С-42,0. Років використання-8р. Стійкість, бал до: посухи-Л-9,0;С-9,0, вилягання-Л-5,0;С-7,0, бурої іржі Л -6,0, С-9,0; аскохітозу-Л-9,0; С-9,0. Вміст клітковини, %:Л -23,5, С-24,6. Вміст білка, %: Л-14,6, С-14,0. Напрямок використання - сінокісно-пасовищний. Рекомендована зона вирощування -Лісостеп, Степ..

Сільськогосподарські: овочеві

Баклажан

06022006 Бізе

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Габітус - напівпрямостояча. Рослина за висотою середня, за довжиною стебла середня. Стебло антоціанового забарвлення. Листок за розміром великий, край хвилястий, інтенсивність хвилястості краю помірна. Пухирчастість наявна, опушеність слабка. Плід за довжиною короткий, діаметр середній, форма куляста, колір шкірки у товарній стиглості – рожево - бузковий, смугастість відсутня, ребристість наявна. Колір м'якуша плоду білуватий. Колір шкірки за фізіологічної стиглості плоду вохристий. Час початку цвітіння і стиглості середній.

Загальна врожайність 42-58 т/га. Маса товарного плоду 300 – 420 г; період від сівби до початку достигання (від висадки 30-ти денної розсади) 85-105 днів; період плодоношення 35-65 днів; дружність достигання 60-62%; ураженість хворобами та пошкодження шкідниками, % макроспоріозом 1,2-1,3; гнилями 0,3-0,4; вірусними хворобами 0,2; попелицею 0,4-0,5; вміст сухої речовини в плоді 12,4-13,0 %; транспортабельність 4,7-4,9 балів.

06022001 Надір

Заявник: Приватне підприємство "Агросвіт"

Власник(и):