

до відростання.

Середня урожайність сухої речовини - 121ц/га. Вміст сирого протеїну – 11,3%. Вміст клітковини - 27,5%. Сорт середньостиглий, має непогані показники посухостійкості, зимостійкості та стійкості до хвороб. Висота рослини - 70см. Років використання - 4р. Маса 100 насінин - 4,5. г.Напрямок використання - кормовий.

Стоколос прибережний

07479001 Боян

Заявник: Інститут кормів Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Антоціанове забарвлення справжнього листка дуже слабе. Природна висота рослини – середня, листкова піхва з легким ступенем опушення, листок зелений, прапорцевий листок середній за довжиною, шириною та розміром. Стебло середнє, час початку колосіння – ранній, динаміка колосіння – помірна, тенденція до колосіння після скошування – дуже мала. Суцвіття середнє, нещільне, з дуже слабким антоціановим забарвленням півок.

Урожайність, ц/га сухої речовини: Л- 134,75; С-99,25. Вегетаційний період Л-59 дн, С-50дн. Висота рослини, см: Л-105, С-110. Залистяність, %: Л-48,0, С-42,0. Років використання-8р. Стійкість, бал до: посухи-Л-9,0;С-9,0, вилягання-Л-5,0;С-7,0, бурої іржі Л -6,0, С-9,0; аскохітозу-Л-9,0; С-9,0. Вміст клітковини, %:Л -23,5, С-24,6. Вміст білка, %: Л-14,6, С-14,0. Напрямок використання - сінокісно-пасовищний. Рекомендована зона вирощування -Лісостеп, Степ..

Сільськогосподарські: овочеві

Баклажан

06022006 Бізе

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Габітус - напівпрямостояча. Рослина за висотою середня, за довжиною стебла середня. Стебло антоціанового забарвлення. Листок за розміром великий, край хвилястий, інтенсивність хвилястості краю помірна. Пухирчастість наявна, опушеність слабка. Плід за довжиною короткий, діаметр середній, форма куляста, колір шкірки у товарній стиглості – рожево - бузковий, смугастість відсутня, ребристість наявна. Колір м'якуша плоду білуватий. Колір шкірки за фізіологічної стиглості плоду вохристий. Час початку цвітіння і стиглості середній.

Загальна врожайність 42-58 т/га. Маса товарного плоду 300 – 420 г; період від сівби до початку достигання (від висадки 30-ти денної розсади) 85-105 днів; період плодоношення 35-65 днів; дружність достигання 60-62%; ураженість хворобами та пошкодження шкідниками, % макроспоріозом 1,2-1,3; гнилями 0,3-0,4; вірусними хворобами 0,2; попелицею 0,4-0,5; вміст сухої речовини в плоді 12,4-13,0 %; транспортабельність 4,7-4,9 балів.

06022001 Надір

Заявник: Приватне підприємство "Агросвіт"

Власник(и):

Підтримувач(и):

266

Габітус - напівпрямостоячий. Рослина за висотою середня, за довжиною стебла коротка. Стебло антоціанового забарвлення. Листок за розміром середній, край хвилястий, інтенсивність хвилястості краю слабка. Пухирчастість наявна, опушеність відсутня або дуже слабка. Плід середній, діаметр середній, форма циліндрична, колір шкірки у товарній стиглості - темно-фіолетовий, смугастість та ребристість відсутні. Колір м'якуша плоду зеленуватий. Колір шкірки за фізіологічної стиглості плоду коричневий. Час початку цвітіння і стиглості середній.

Загальна врожайність 40-50 т/га. Маса товарного плоду 200 - 250 г; період від сівби до початку досягання (від висадки 30-ти денної розсади) 85-95 днів; період плодоношення 25 днів; дружність досягання 95%; вміст сухої речовини в плоді 9 %; транспортабельність 5 балів.

06022002 Негус

Заявник: Приватне підприємство "Агросвіт"

Власник(и):

Підтримувач(и):

Габітус - напівпрямостоячий. Рослина за висотою середня, за довжиною стебла середня. Стебло антоціанового забарвлення. Листок за розміром великий, край хвилястий, інтенсивність хвилястості краю сильна. Пухирчастість відсутня, опушеність слабка. Плід за довжиною середній, діаметр середній, форма куляста, колір шкірки у товарній стиглості - пурпуровий, смугастість відсутня, ребристість наявна. Колір м'якуша плоду зеленуватий. Колір шкірки за фізіологічної стиглості плоду коричневий. Час початку цвітіння і стиглості середній.

Загальна врожайність 35-40 т/га. Маса товарного плоду 180 – 220 г; період від сівби до початку досягання (від висадки 30-ти денної розсади) 80-90 днів; період плодоношення 25 днів; дружність досягання 95%; вміст сухої речовини в плоді 9 %; транспортабельність 5 балів.

06022003 Паріс

Заявник: Приватне підприємство "Агросвіт"

Власник(и):

Підтримувач(и):

Габітус - розлога. Рослина за висотою середня, за довжиною стебла середня. Стебло антоціанового забарвлення. Листок за розміром середній, край хвилястий, інтенсивність хвилястості краю помірна. Пухирчастість наявна, опушеність слабка. Плід за довжиною середній, діаметр малий, форма циліндрична, колір шкірки у товарній стиглості – темно-фіолетовий, смугастість відсутня, ребристість відсутня. Колір м'якуша плоду зеленуватий. Колір шкірки за фізіологічної стиглості плоду коричневий. Час початку цвітіння і стиглості середній.

Загальна врожайність 40-50 т/га. Маса товарного плоду 200 – 250 г; період від сівби до початку досягання (від висадки 30-ти денної розсади) 85-95 днів; період плодоношення 25 днів; дружність досягання 95%; вміст сухої речовини в плоді 9 %; транспортабельність 5 балів.

Буряк столовий

06023006 Андромеда

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"

Власник(и):

Підтримувач(и):

Паросток з антоціановим забарвленням гіпокотилля . Листок довгий, положення у просторі напівпряме, за шириною вузька, широко - еліптичної форми. Антоціанове забарвлення листової платинки слабе, хвилястість краю дуже сильна, пухирчастість помірна. Коренеплід округлої