

форми, на 1/4 заглиблений у ґрунт. Колір шкірки червоний, основне забарвлення м'якушу червоний. Прояв кілець – відсутній або дуже слабкий . Схильність до стрілкування за раннього висіву відсутня або дуже слабка.

Напрямок використання – універсальний. Загальна урожайність сорту 85- 87 т/га, товарна – 80- 85 т/га. Період від повних сходів до початку досягання 87-90 діб. Лежкість – 97-98%. Довгоносики- 0,3-0,4%, Церкоспороз- 1,2-1,7%, Коренейд-0,1%, Придатність до механічного збирання- 4,9

05023005 Вітал

Заявник: Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток з антоціановим забарвленням гіпокотилля . Положення черешка напівпряме, пластинки напівпряме. Листок довгий, листкова пластинка за довжиною коротка , за шириною середня, широко - еліптичної форми. Антоціанове забарвлення листкової пластинки помірне, хвилястість краю помірна, пухирчастість помірна. Коренеплід видовжено- конічної форми, на 1/4 заглиблений у ґрунт. За довжиною довгий (>15), за шириною вузький (<16). Колір шкірки червоний, основне забарвлення м'якушу червоне. Прояв кілець сильний . Схильність до стрілкування за раннього висіву відсутня або дуже слабка.

Напрямок використання – універсальний. Загальна урожайність сорту 33-35 т/га, товарна – 28-31 т/га. Маса товарного плоду – 310-350г. Період від повних сходів до початку досягання 100-110 діб. Дегустаційна оцінка 4,5 балів. Вміст загального цукру – 8-9%. Церкоспороз- 9-15%,

06023007 Гопак

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток з антоціановим забарвленням гіпокотилля . Листок середній, положення черешка напівпряме, пластинки поникле, за шириною вузька, широко - еліптичної форми. Антоціанове забарвлення листкової пластинки помірне, хвилястість краю помірна, пухирчастість сильна. Коренеплід еліптичної форми, на 1/4 заглиблений у ґрунт. Колір шкірки червоний, основне забарвлення м'якушу червоний. Прояв кілець слабкий . Схильність до стрілкування за раннього висіву відсутня або дуже слабка.

Напрямок використання – у свіжому вигляді та для переробки. Загальна урожайність сорту 30- 50 т/га, товарна – 28- 40 т/га. Маса товарного плоду – 200 - 500 г. Період від повних сходів до початку досягання 95-105 діб. Дегустаційна оцінка 4,5-5,0 балів. Вміст загального цукру – 9-14%.

06023008 Пабло F1

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток з антоціановим забарвленням гіпокотилля . Положення черешка напівпряме, пластинки напівпоникле. Листок середній, листкова пластинка за довжиною коротка , за шириною вузька, еліптичної форми. Антоціанове забарвлення листкової пластинки помірне, хвилястість краю помірна, пухирчастість помірна. Коренеплід видовжено- циліндричної форми, на 1/4 заглиблений у ґрунт. Колір шкірки червоний, основне забарвлення м'якушу світле. Прояв кілець сильний . Схильність до стрілкування за раннього висіву відсутня або дуже слабка.

Напрямок використання – у свіжому вигляді та для переробки. Загальна урожайність сорту 100 т/га, товарна – 90 т/га. Маса товарного плоду – 300г. Період від повних сходів до початку досягання 80 діб. Дегустаційна оцінка 9 балів. Церкоспороз- 1%, Борошнистою росюю - 1% .