

06023003 Торпедо

Заявник: Приватне підприємство "Агросвіт"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток з антоціановим забарвленням гіпокотилля . Положення черешка пряме, пластинки пряме. Листок довгий, листкова пластинка за довжиною коротка ,за шириною середня, широко - еліптичної форми. Антоціанове забарвлення листкової пластинки відсутнє або дуже слабе, хвилястість краю слабка, пухирчастість помірна. Коренеплід яйцевидної форми, на 1/2 заглиблений у ґрунт. За довжиною короткий (>10), за шириною вузький (<16). Колір шкірки червоний, основне забарвлення м'якушу червоне. Прояв кілець слабкий

Напрямок використання – універсальний. Загальна урожайність сорту 50-70 т/га, товарна – 48-68 т/га. Маса товарного плоду – 150-200г. Період від повних сходів до початку достигання 95-105 діб. Вміст загального цукру – 10-12%. Сухої речовини – 15-17% .

06023002 Чорномор

Заявник: Приватне підприємство "Агросвіт"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток з антоціановим забарвленням гіпокотилля . Положення черешка пряме, пластинки напівпрямі. Листок середній, листкова пластинка за довжиною коротка ,за шириною вузька, вузько - еліптичної форми. Антоціанове забарвлення листкової пластинки дуже сильне, хвилястість краю помірна, пухирчастість помірна. Коренеплід видовжено- конічної форми, на 1/4 заглиблений у ґрунт. За довжиною довгий (>15), за шириною вузький (<16). Колір шкірки червоний, основне забарвлення м'якушу червоне. Прояв кілець слабкий . Схильність до стрілкування за раннього висіву відсутня або дуже слабка.

Напрямок використання – універсальний. Загальна урожайність сорту 50-70 т/га, товарна – 47-68 т/га. Маса товарного плоду – 150-200г. Період від повних сходів до початку достигання 95-100 діб. Дегустаційна оцінка 4,6 балів. Вміст загального цукру – 9-10%. Сухої речовини – 16-17%

Горох овочевий**04024005 Арія**

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Ярд"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослини сорту дуже низькі, без антоціанового забарвлення, з наявними вторинними листочками, з двома-трьома квітками на вузлі, має ранній час цвітіння та середній достигання.

Стебло нефасційоване, середньої довжини з середньою кількістю вузлів.

Листки помірно зеленого кольору без сіруватого відтінку та середньою кількістю вторинних листочків.

Вторинні листочки характеризуються такими ознаками: відсутнім восковим нальотом на верхніх листочках, середнім розміром, середньою довжиною, вузькі за шириною, середньою відстанню від найширшої частини до основи та слабкою ступінню зубчастості.

Прилисток добре розвинутий, без наявної формою "кролячих вух", з наявним восковим нальотом на його поверхні, має середню довжину та ширину, з помірною плямистістю.

Квітка з середньою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистка з загостреною формою верхівки

верхнього чашолистика на другому квітучому вузлі.

Колір паруса білий, з малою максимальною його шириною, прямою формою основи та помірно інтенсивністю хвилястості.

Біб має велику кількість насінних зачатків, середньої довжини і вузький, помірно зеленого кольору, з наявною пергаментністю, з випуклим типом вигину та слабким ступенем його прояву.

Насінина неправильної форми, має просту форму крохмальних зерен, сім'ядолі зеленого кольору із сильною зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин - середня.

Сорт характеризується універсальним напрямком використання: свіжий і сухий вид, натуральні та заморожені консерви. Період від повних сходів до початку дозрівання становить 52 доби, а період плодоношення – 6.

Товарна урожайність бобів – 10,8 т/га з виходом чистого зерна 48,8 %, вмістом сухої речовини в зерні 20,1 %, загального цукру 6,2 %, вітаміну С – 28,9 мг /100 г, білку – 26,7 %.

Дегустаційна оцінка і свіжих плодів – 4,6, а при переробці – 4,5 бала.

Ураженість аскохітозом – 10,2, а корневими гнилями – 20,4 %.

Сорт характеризується універсальним напрямком використання: свіжий і сухий вид, натуральні та заморожені консерви. Період від повних сходів до початку дозрівання становить 52 доби, а період плодоношення – 6.

Товарна урожайність бобів – 10,8 т/га з виходом чистого зерна 48,8 %, вмістом сухої речовини в зерні 20,1 %, загального цукру 6,2 %, вітаміну С – 28,9 мг /100 г, білку – 26,7 %.

Дегустаційна оцінка і свіжих плодів – 4,6, а при переробці – 4,5 бала.

Ураженість аскохітозом – 10,2, а корневими гнилями – 20,4 %.

04024004 Арфа

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Ярд"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослини сорту середньої висоти, без антоціанового забарвлення, з наявними вторинними листочками, двома-трьома квітками на вузлі, має середній час цвітіння та досягання.

Стебло нефасційоване, середньої довжин з середньою кількістю вузлів.

Листки помірно зеленого кольору без сіруватого відтінку та середньою кількістю вторинних листочків.

Вторинні листочки характеризуються такими ознаками: відсутнім восковим нальотом на верхніх листочках, середнім розміром, середньою довжиною, вузькі за шириною, короткою відстанню від найширшої частини до основи та відсутністю зубчастості.

Прилисток добре розвинутий, без наявної форми "кролячих вух", має восковий наліт, короткий з середньою шириною та з помірно плямистістю.

Квітка з малою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має малу ширину чашолистика з загостреною формою верхівки верхнього чашолистика на другому квітучому вузлі.

Колір паруса білий з малою максимальною його шириною, прямою формою основи та слабкою інтенсивністю хвилястості.

Біб має середню кількість насінних зачатків, середньої довжини і вузький, помірно зеленого кольору з наявною пергаментністю, випуклим типом вигину та слабким ступенем його прояву.

Насінина неправильної форми, має просту форму крохмальних зерен, сім'ядолі зеленого кольору із сильною зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин - середня.

Сорт характеризується універсальним напрямком використання: свіжий і сухий вид, натуральні та заморожені консерви. Період від повних сходів до початку дозрівання становить 56 діб, а період плодоношення – 6. Дружність визрівання – висока.