

Товарна урожайність бобів – 11,9 т/га з виходом чистого зерна 49,8 %, вмістом сухої речовини в зерні 20,56 %, загального цукру 6,9 %, вітаміну С – 29,4 мг /100 г, білку – 26,9 %. Дегустаційна оцінка і свіжих плодів – 4,6, а при переробці – 4,5 бала.

Ураженість аскохітозом – 11, а корневими гнилями – 19,4 %.

04024003 Лея

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Ярд"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослини сорту низькі, без антоціанового забарвлення, з наявними вторинними листочками, двома-трьома квітками на вузлі, має ранній час цвітіння та середній достигання.

Стебло нефасційоване, коротке з середньою кількістю вузлів.

Листки помірно зеленого кольору без сіруватого відтінку та малою кількістю вторинних листочків.

Вторинні листочки характеризуються такими ознаками: відсутнім восковим нальотом на верхніх листочках, середнім розміром, середні за довжиною, шириною та відстанню від найширшої частини до основи та відсутністю зубчастості.

Прилисток добре розвинутий, без наявної форми "кролячих вух", має восковий наліт, середню довжину та ширину з помірно плямистістю.

Квітка з малою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистка та загостреною формою верхівки верхнього чашолистика на другому квітуючому вузлі.

Колір паруса білий з малою максимальною його шириною, піднесеною формою основи та середньою інтенсивністю хвилястості.

Біб має середню кількість насінних зачатків, довгий і вузький, помірно зеленого кольору з наявною пергаментністю, випуклим типом вигину та слабким ступенем його прояву.

Насінина неправильної форми, має просту форму крохмальних зерен, сім'ядолі зеленого кольору із помірно зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин - мала.

Сорт характеризується універсальним напрямом використання: свіжий і сухий вид, натуральні та заморожені консерви. Період від повних сходів до початку дозрівання становить 62 діб, а період плодоношення – 6. Дружність визрівання – висока.

Товарна урожайність бобів – 13,4 т/га з виходом чистого зерна 48,9 %, вмістом сухої речовини в зерні 20,72 %, загального цукру 7,1 %, вітаміну С – 30,6 мг /100 г, білку – 27,5 %. Дегустаційна оцінка і свіжих плодів – 4,6, а при переробці – 4,5 бала.

Ураженість аскохітозом – 9,2, а корневими гнилями – 23,4 %.

04024001 Рада

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Ярд"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослини сорту низькі, без антоціанового забарвлення, з наявними вторинними листочками, одною-двома квітками на вузлі, мають середній час і цвітіння, і достигання.

Стебло нефасційоване, середньої довжини з середньою кількістю вузлів.

Листки помірно зеленого кольору без сіруватого відтінку та малою кількістю вторинних листочків.

Вторинні листочки характеризуються такими ознаками: відсутнім восковим нальотом на верхніх листочках, середнім розміром, середні за довжиною, шириною та відстанню від найширшої частини до основи та відсутністю зубчастості.

Прилисток добре розвинутий, без наявної форми "кролячих вух", має восковий наліт, середню довжину та ширину з помірно плямистістю.

Квітка з середньою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистка та загостреною формою верхівки верхнього чашолистика на другому квітучому вузлі.

Колір паруса білий з середньою максимальною його шириною, вигнутою формою основи та середньою інтенсивністю хвилястості.

Біб має велику кількість насінних зачатків, довгий і вузький, помірно зеленого кольору з наявною пергаментністю, увігнутим типом вигину з відсутнім або слабким ступенем його прояву.

Насінина циліндричної форми, має просту форму крохмальних зерен, сім'ядолі жовтого кольору із сильною зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин - середня.

Сорт характеризується універсальним напрямом використання: свіжий і сухий вид, натуральні та заморожені консерви. Період від повних сходів до початку дозрівання становить 67 діб, а період плодоношення – 6. Дружність визрівання – висока.

Товарна урожайність бобів – 13,8 т/га з виходом чистого зерна 50,3 %, вмістом сухої речовини в зерні 20,35 %, загального цукру 7,2 %, вітаміну С – 31,2 мг /100 г, білку – 28,1 %. Дегустаційна оцінка і свіжих плодів – 4,7, а при переробці – 4,6 бала.

Ураженість аскохітозом – 8,9, а корневими гнилями – 29,6 %.

04024002 Фея

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Ярд"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослини сорту низькі, без антоціанового забарвлення, з наявними вторинними листочками, двома-трьома квітками на вузлі, має пізній час цвітіння, і достигання.

Стебло нефасційоване, коротке з середньою кількістю вузлів.

Листки помірно зеленого кольору, без сіруватого відтінку та малою кількістю вторинних листочків.

Вторинні листочки характеризуються такими ознаками: відсутнім восковим нальотом на верхніх листочках, середніми розміром, довжиною, шириною, відстанню від найширшої частини до основи та відсутністю зубчастості.

Прилисток добре розвинутий з відсутньою формою "кролячих вух", має восковий наліт, середні довжину та ширину з помірно плямистістю.

Квітка з середньою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистка та загостреною формою верхівки верхнього чашолистика на другому квітучому вузлі.

Колір паруса білий з середньою максимальною його шириною, піднесеною формою основи та помірною інтенсивністю хвилястості.

Біб має велику кількість насінних зачатків, дуже довгий і вузький, помірно зеленого кольору з наявною пергаментністю, увігнутим типом вигину та слабким ступенем його прояву.

Нестигле насіння має помірно зелене забарвлення.

Насінина неправильної форми, має складну форму крохмальних зерен, сім'ядолі зеленого кольору із сильною зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – середня (205-210 г).

Напрямок використання: продовольчий. Період від повних сходів до початку дозрівання становить 71 доба, а період плодоношення – 6. Дружність визрівання – висока.

Товарна урожайність бобів – 14,1 т/га з виходом чистого зерна 48,6 %, вмістом сухої речовини в зерні 21-70 %, загального цукру 6,4 %, вітаміну С – 31,7 мг /100 г, білку – 29,3 %. Дегустаційна оцінка і свіжих плодів і при переробці – 8 балів.