

07032004 Легасі F1

Заявник: Харріс Моран Сідс Компані

Власник(и):

Підтримувач(и):

Антоціанове забарвлення піхви першого листка відсутнє. Положення листової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла слабе. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Волоть середньої щільності. Антоціанове забарвлення "шовку" відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - середня (від 101 до 125 см). Ніжка качана за довжиною - середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, низу - жовтувато-білий, Антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє.

Загальна урожайність - 19,2 т/га, вихід технічно стиглого зерна від маси качана - 63 %. Вміст цукрів в зерні технічної стиглості - 8,3 %, вміст крохмалю - 13,4 %. Дегустаційна оцінка свіжої та консервованої продукції - 9 балів.

07032006 Рандеву F1

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(и):

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка слабка. Положення листової пластинки в просторі похиле. Інтенсивність антоціанового забарвлення повітряних коренів стебла слабка. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від дуже раннього до раннього. Волоть середньої щільності. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" помірною. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - середня (від 126 до 150 см). Ніжка качана за довжиною - коротка (від 5,1 до 10 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Кількість зернових рядів середня (від 16 до 18 шт), колір зернини - жовтувато-білий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє.

ФАО - 190. Загальна урожайність - 9,2 т/га, вихід технічно стиглого зерна від маси качана - 63,2 %. Посухостійкість та холодостійкість - 5 балів. Ураженість летючою сажкою - 3,7 %, пухирчастою сажкою - 5,6 %. Вміст сухої речовини в зерні технічної стиглості - 28,9 %, цукрів - 6,86 %, крохмалю - 7,21 %. Дегустаційна оцінка свіжої продукції - 5 балів, консервованої - 4,9 балів.

07032003 Раствлер F1

Заявник: Харріс Моран Сідс Компані

Власник(и):

Підтримувач(и):

Антоціанове забарвлення піхви першого листка відсутнє. Положення листової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла відсутнє. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від дуже раннього до раннього. Волоть середньої щільності. Антоціанове забарвлення "шовку" відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - коротка (від 101 до 125 см). Ніжка качана за довжиною - коротка (від 5,1 до 10 см). Качан за формою циліндричний, за довжиною - довгий (23-26 см). Кількість зернових рядів середня, колір зернини - жовтий, Антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє.

Загальна урожайність - 15,8 т/га, вихід технічно стиглого зерна від маси качана - 61 %. Вміст цукрів в зерні технічної стиглості - 10,4 %, крохмалю - 11,6 %. Дегустаційна оцінка свіжої та консервованої продукції - 10 балів.