

06035030 Сатмар F1

Заявник: ЗАТ „ЗКІ Золдецер Кутато Интезет”

Власник(и):

Підтримувач(и):

Індетермінантний тип росту. Сила росту - середня. Листок великого розміру, пухирчастість помірна, хвилястість країв помірна. За вираженням статі рослини – переважно жіночі квітки. Поверхня зав'язі опушена, забарвлення біле. Відсутня партенокарпія. Циліндричної форми, за довжиною короткий, жовтого кольору. Ребристість наявна, ступінь ребристісті слабка. Опушення густе, горбочки наявні. Плямистість відсутня. Гіркота біля основи плоду відсутня.

Загальна врожайність – 130 т/га; період від повних сходів до першого збору 35-50 дні; період плодоношення 70-90 днів. Вміст сухої речовини – 5%. Дегустаційна оцінка: свіжих плодів - 8 балів, за переробки – 9 балів. Для товарного виробництва та консервний.

06035032 Соната F1

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Власник(и):

Підтримувач(и):

Індетермінантний тип росту. Сила росту - середня. Листок великого розміру, пухирчастість помірна, хвилястість країв слабка. За вираженням статі рослини – чоловічих і жіночих квіток майже порівну. Поверхня зав'язі опушено-шипувата, забарвлення біле. Відсутня партенокарпія. Циліндричної форми, за довжиною середній, зеленого кольору. Ребристість відсутня, ступінь ребристісті слабка. Опушення відсутнє або дуже незначне, горбочки наявні. Плямистість наявні, плями великі неправильні, інтенсивність помірна. Гіркота біля основи плоду відсутня.

Загальна врожайність – 60 т/га, маса товарного плоду – 40 г; довжина товарного плоду -10 см; діаметр товарного плоду 3 см; період від повних сходів до першого збору 42 дні; період плодоношення 90 днів. Ураженість хворобами: пероноспрозом – 20%, борошнистою россою – 1%, бактеріозом – 5%. Пошкодження шкідниками – попелицею 10%. Дегустаційна оцінка: свіжих плодів - 9 балів, за переробки – 10 балів. Універсальний напрямок використання.

06035028 Сопілка

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"

Власник(и):

Підтримувач(и):

Індетермінантний тип росту. Сила росту - сильна. Листок великого розміру, пухирчастість помірна, хвилястість країв помірна. За вираженням статі рослини – чоловічих і жіночих квіток майже порівну. Поверхня зав'язі шипувата, забарвлення біле. Наявна партенокарпія. Плід довгий, серцеподібної форми, зеленого кольору. Ребристість наявна, ступінь ребристісті слабка. Опушення відсутнє або дуже незначне, горбочки наявні. Плямистість наявна, плями великі неправильні, інтенсивність помірна. Гіркота біля основи плоду відсутня.

Загальна врожайність – 85-90 т/га, маса товарного плоду – 230-255 г, діаметр товарного плоду 4,0 см; період від повних сходів до першого збору 50-53 дні; період плодоношення 65-72 днів. Ураженість хворобами: пероноспрозом – 3,0-3,3%, борошнистою россою – 0,1-0,3%, антрактозом – 0,4-0,5%. Ураженість, % вірусними хворобами -0,1. Пошкодження шкідниками – 3,8%. Вміст сухої речовини – 4,8-5,0%. Дегустаційна оцінка 4,9-5,0 балів. Універсального напряму використання.

Пастернак