

Група стиглості - ранньостиглий. Загальна урожайність 60-65 т/га. Маса товарного плоду 120-130 г. Період від повних сходів до початку дозрівання 90-95 днів. Вміст сухої речовини в плоді 5,4-5,6 %. Вміст загального цукру 2,6-2,7 %. Вміст вітаміну С 18,1-18,6 мг%.

08040015 Перфект МС3 F1

Заявник: Мей Агро Тохумсулук Санаї ве Тісарет А.С.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гібрид детермінантного типу розвитку. Листки довгі, середні за шириною, пухирчастість сильно виражена, а глясுவатість слабо виражена. Плід середнього розміру, у поздовжньому розрізі кутастої форми з товстим перикарпом, 2-3-камерний. Плід за досягання червоного забарвлення.

Загальна урожайність 95 т/га. Маса товарного плоду 55 г. Період від повних сходів до початку дозрівання 120 днів. Вміст сухої речовини в плоді 5 %.

06040034 Сармат

Заявник: Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гібрид детермінантного типу розвитку. Листки довгі і широкі, пухирчастість сильно виражена, а глясுவатість слабо виражена. Плід середнього розміру, у поздовжньому розрізі кутастої форми з тонким перикарпом, 2-3-камерний. Плід за досягання червоного забарвлення. Час цвітіння та досягання - середній.

Група стиглості - середньостиглий. Загальна урожайність 60-78 т/га. Маса товарного плоду 100-120 г. Період від повних сходів до початку дозрівання 111-115 днів. Вміст сухої речовини в плоді 5,6-6 %. Вміст загального цукру 3,1-3,8 %. Вміст вітаміну С 21,9-23,7 мг%.

06040044 Слайдер

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гібрид детермінантного типу розвитку. Листки довгі, середні за шириною, пухирчастість помірно виражена, а глясுவатість слабо виражена. Плід середнього розміру, у поздовжньому розрізі кутастої форми з помірним перикарпом, 4-5, або 6-камерний. Плід за досягання червоного забарвлення.

Група стиглості - середньоранній. Загальна урожайність 77 т/га. Маса товарного плоду 200-215 г. Період від повних сходів до початку дозрівання 105-110 днів. Вміст сухої речовини в плоді 7,7 %. Вміст загального цукру 6,7 %. Вміст вітаміну С 73 мг%.

Редиска

05038012 Шахрі

Заявник: Вілморін

Власник(и):

Підтримувач(і):

Листкова розетка: за шириною зростання при основі середня. Положення листка у просторі напівпряме, середньої довжини, обернено-яйцеподібної форми. Опушення слабе. Черешок без антоціанового забарвлення, Коренеплід округлої форми, червоного кольору. Товщина кори тонка. Забарвлення м'якоті матове біле. Час досягання пізній. Здатність до утворення дупла середня.

Товарна урожайність 40 т/га, вихід стиглих товарних плодів 85%. Дегустаційна оцінка 7 балів. Середня маса плоду 50 г. Днів до досягання 35.

Салат латук

07291001 Кармесі

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмБХ

Власник(и):

Підтримувач(і):

У рослини чорний колір насінини. Листок напівпрямостоячий. Рослина середня за діаметром, головку не утворює. У листка горизонтальне положення за збиральної стиглості. Форма листка еліптична, наявне антоціанове забарвлення сильної інтенсивності. Час збиральної стиглості пізній.

До досягання 60 днів. Товарний урожай 315 ц/га. Несправжня борошниста роса 0,2%.

08291001 Малахіт

Заявник: Ніжинський агротехнічний інститут Національного аграрного університету

Власник(и):

Підтримувач(і):

У рослини чорний колір насінини. Листок напівпрямостоячий. Рослина середня за діаметром, головку не утворює. У листка напівпрямостояче положення за збиральної стиглості. Форма листка еліптична, наявне антоціанове забарвлення сильної інтенсивності. Час збиральної стиглості ранній.

До досягання 30 днів. Товарний урожай 170 ц/га.

Цибуля городня

02041001 Антоніна

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина з помірною кількістю листків на псевдостеблі. Листки від прямих до напівпрямих, середні з слабким восковим нальотом, помірною інтенсивністю зеленого кольору та слабкою зігнутістю. Несправжнє стебло коротке та мале, цибулина не розщеплюється на цибулини, середнього розміру, поперечноеліптична, форма плеча злегка опукла, основи плеската. Прикріплення сухих лусок помірно, за барвлення коричневе.