

\* Дерево середньоросле, напівпряме. Квітконосний пагін тонкий з короткими міжвузлями і сильним антоціановим забарвленням верхівки. Генеративні бруньки розташовані щільно по дві і більше. Квітка яскрава. Забарвлення внутрішнього боку чашечки оранжеве. Віночок переважно темно-рожевий. Пелюсток п'ять. Вони середнього розміру, округлі. Тичинки розміщені на одному рівні з пелюстками. Приймочка - на одному рівні з пиляками. Зав'язь опушена. Прилистки середньої довжини. Листкова пластинка зелена, довга, із загнутою верхівкою. Черешок листка короткий, з двома округлими нектарниками. Плід середнього розміру, округлий, асиметричний. Досить помітний бічний шов. Ямка плодоніжки неглибока. Основний колір плоду зелений. Наявне червоне мармурове поверхнєве забарвлення. Плід густо опушений. Шкірка товста, зростання з м'якоттю сильне. М'якоть помірно тверда, біла, не волокниста, солодко-кисла. Антоціанове забарвлення під шкіркою, м'якоті, навколо кісточки відсутнє або дуже слабке. Кісточка середнього розміру, еліптична, помірно коричнева, борозенчаста. Здатність до розтріскування кісточки слабка. Зростання з м'якоттю помірне. Час листопаду середньопізній. Час початку цвітіння і тривалість - середні. Час споживчої стиглості ранній. Здатність врожаю до передчасного обпадання відсутня або дуже слабка.

За даними заявника за схеми садіння 5 x 3 м середня врожайність становить 20,6 т/га, з дерева - 31,0 кг. Маса плоду: середня - 95, максимальна - 125 г. Зимостійкість 8,5 балів. Вимерзання квіткових бруньок 17-20%. Посухостійкість 8,3 бали. Стійкість проти хвороб: кучерявості листя - 7,7, клястероспоріозу - 7,5 балів. Стійкість проти шкідників 8,1 балів. Дегустаційна оцінка свіжих плодів 8,7 балів. Транспортабельність висока. Група достигання рання. Рекомендовані ґрунтово-кліматичні зони - Лісостеп, Степ.

\* Дані заявника.

## Малина

### 08077001 Брусвяна

Заявник: Дмитрієв Володимир Ігорович

Власник(и):

Підтримувач(і):

\* На молодих пагонах рослини наявне сильне антоціанове забарвлення. Пагони помірно шипуваті. Шипи від зеленого до коричнево-зеленого забарвлення. Повністю розвинуті пагони із слабким восковим нальотом, довгі. Листок зелений, помірно рельєфний, з трьома-п'ятьма листочками, які доторкуються. Нижня пара листочків має дуже короткі черешки. Квітка велика. Квітконіжка без антоціанового забарвлення. Плодоносні пагони довгі. Ягода помірно-червона, дуже велика, тверда, помірно глясувата. Основне плодоношення проходить на пагонах поточного року восени. Пагони з'являються дуже рано. Достигання плодів раннє. Урожайний сезон триває довго.

За даними заявника за схеми садіння 2,5 x 0,5 м середня врожайність становить 1,1 ц/га. Маса ягоди: середня - 8,0, максимальна - 15,0 г. Ступінь стійкості до підмерзання становить 7-8 балів. Вимерзання квіткових бруньок складає 20%. Посухостійкість і стійкість проти основних хвороб становить 8 балів. Стійкість проти пошкодження шкідниками - 9 балів. Дегустаційна оцінка свіжих ягід - 8,8 балів. Транспортабельність - 8,5 балів. Група достигання рання. Рекомендовані ґрунтово-кліматичні зони: Полісся, Лісостеп.

\* Дані заявника.

### 08077003 Глен Ампле

Заявник: Ліцензоване Господарство Зколкарське Христина Кшевінська

Власник(и):

Підтримувач(і):

\* На молодих пагонах рослини антоціанового забарвлення нема. Пагони нещільно вкриті зеленими шипами. Повністю розвинуті пагони із слабким восковим нальотом, довгі. Листок темно-зелений, помірно рельєфний, з трьома-п'ятьма листочками, які не перекриваються. Нижня пара листочків має середньої довжини черешки. Квітка середнього розміру. Квітконіжка без антоціанового забарвлення. Плодоносні пагони



дуже довгі. Ягода помірно-червона, дуже велика, тверда, помірно глянсувата. Основне плодоношення проходить на минулорічних пагонах влітку. Бруньки розкриваються у середні строки. Цвітіння рослин і досягання плодів відбуваються у середні строки. Урожайний сезон триває довго.

За даними заявника за схеми садіння 2,0 x 0,5 м середня врожайність становить 200 ц/га. Маса ягоди: середня - 6,0, максимальна - 8,0 г. Зимо- і посухостійкість становлять 9 балів. Вимерзання квіткових бруньок складає 5%. Стійкість проти ураження основними хворобами становить 8 балів. Стійкість проти пошкодження шкідниками - 7-8 балів. Дегустаційна оцінка свіжих ягід і за переробки - 9 балів. Транспортабельність - 9 балів. Група досягання пізня. Рекомендовані ґрунтово-кліматичні зони: Полісся, Лісостеп, Степ.

\* Дані заявника.

### **08077002 Ляшка**

Заявник: Ліцензоване Господарство Золкарське Христина Кшевінська

Власник(и):

Підтримувач(і):

\* На молодих пагонах рослини наявне помірне антоціанове забарвлення. Пагони нещільно шипуваті. Шипи зеленого кольору. Повністю розвинуті пагони із слабким восковим нальотом, довгі, від коричневого до пурпурово-коричневого забарвлення. Листок темно-зелений, помірно рельєфний, з переважно трьома листочками, які не перекриваються. Нижня пара листочків має середньої довжини черешки. Квітка середнього розміру. Квітконіжка без антоціанового забарвлення. Плодоносні пагони дуже довгі. Ягода блідо-червона, дуже велика, тверда, помірно глянсувата. Основне плодоношення проходить на пагонах минулого року влітку. Бруньки розкриваються рано. Цвітіння рослин і досягання плодів раннє. Тривалість урожайного сезону середня.

За даними заявника за схеми садіння 2,0 x 0,5 м середня врожайність становить 170 ц/га. Маса ягоди: середня - 7,0, максимальна - 10,0 г. Зимо- і посухостійкість становлять 9 балів. Вимерзання квіткових бруньок складає до 10%. Дегустаційна оцінка свіжих ягід і за переробки - 9 балів. Транспортабельність - 9 балів. Група досягання рання. Рекомендовані ґрунтово-кліматичні зони: Полісся, Лісостеп, Степ.

\* Дані заявника.

## **Смородина чорна**

### **07083002 Дідорівська**

Заявник: Національний аграрний університет

Власник(и):

Підтримувач(і):

\* Куц середньої висоти і ширини, із середньою кількістю скелетних пагонів. Брунька з помірним антоціановим забарвленням і слабким восковим нальотом. Антоціанове забарвлення молодого пагона помірне. Листок помірно зелений, зі слабким блиском. Язичок листкової пластинки злегка відкритий. Біля основи черешка є слабке антоціанове забарвлення. З однієї бруньки утворюється один або два квіткових грона. Частки оцвітини і зав'язь зі слабким антоціановим забарвленням. Ягода велика, округла, тверда, чорна. Час розпускання бруньок і цвітіння середній. Ягоди досягають у середні строки.

За даними заявника за схеми садіння 3,0 x 0,7 м середня врожайність становить 17,7 т/га, а середній урожай з куща 3,7 кг. Маса ягоди: середня - 2,1, максимальна - 4,1 г. Зимостійкість - 9,0, посухостійкість - 8,0 балів. Ураження хворобами становить 1,0, шкідниками - 0,5 балів. Дегустаційна оцінка свіжих ягід 8,2, транспортабельність 7,9 балів. Група досягання середня. Рекомендовані ґрунтово-кліматичні зони: Полісся, Лісостеп, Степ.

\* Дані заявника.